

Polynômes et fractions rationnelles

\mathbb{K} désigne un sous-corps de \mathbb{C} .

En fait tout corps convient, mais pour certaines propriétés, on a besoin qu'il soit de caractéristique nulle, c'est-à-dire tel que $n_{\mathbb{K}} = n \cdot 1_{\mathbb{K}} = 1_{\mathbb{K}} + \dots + 1_{\mathbb{K}} \neq 0_{\mathbb{K}}$ si $n \in \mathbb{N}^*$.

L'ALGÈBRE DES POLYNÔMES

1 Polynômes formels à une indéterminée

Se donner un polynôme à coefficients dans \mathbb{K} , c'est se donner la suite $(a_0, a_1, \dots, a_d, 0, 0, \dots) \in \mathbb{K}^{(\mathbb{N})}$ de ses coefficients ayant un nombre fini de termes non nuls (nulle à partir d'un certain rang). On parle alors de suite **presque nulle**.

On note alors, pour tout $k \in \mathbb{N}$, X^k la suite presque nulle $(0, \dots, 0, \underbrace{1}_{k^e}, 0, 0, \dots)$.

Cela permet de transformer la notation $(a_0, a_1, \dots, a_d, 0, 0, \dots)$ en

$$P = a_0 + a_1 X + \dots + a_d X^d + 0 + 0 + \dots = \underbrace{\sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k}_{\text{somme finie}} = \sum_{k=0}^d a_k X^k.$$

On note parfois $P(X)$ pour P .

- X est appelée **indéterminée**. L'indéterminée n'est pas un nombre! Elle n'a pas de valeur. Elle représente la suite presque nulle $(0, 1, 0, 0, \dots)$.
- L'ensemble des polynômes à une indéterminée à coefficients dans \mathbb{K} est noté $\mathbb{K}[X]$.
- Par définition, $P = \sum a_k X^k = Q = \sum b_k X^k \iff \forall k, a_k = b_k$ (égalité de deux suites). Les coefficients d'un polynôme formel sont uniques.
- Le **polynôme nul** est le polynôme dont tous les coefficients sont nuls, noté $0_{\mathbb{K}[X]}$ ou plus simplement 0 .
- On appelle **monôme** tout polynôme de la forme aX^k avec $k \in \mathbb{N}$ et $a \neq 0$.
- On appelle **polynôme constant** tout polynôme $P = a$ où $a \in \mathbb{K}$.
- Si $P \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$, on appelle **degré de P**, noté $\deg P$, le plus grand $k \in \mathbb{N}$ tel que $a_k \neq 0$ (qui existe bien).

$$\deg P = \max\{k \in \mathbb{N} \mid a_k \neq 0\}$$

$a_{\deg P}$ est appelé **coefficient dominant** de P , noté $\text{cd } P$.

Si $\text{cd } P = 1$, P est dit **unitaire** ou **normalisé**.

On pose $\deg 0 = -\infty$.

- On note $\mathbb{K}_n[X] = \{P \in \mathbb{K}[X] \mid \deg P \leq n\}$ l'ensemble des polynômes de degré **au plus** n .

$$\begin{aligned} \mathbb{K}_n[X] &= \{a_0 + a_1 X + \dots + a_n X^n, (a_0, \dots, a_n) \in \mathbb{K}^{n+1}\} \\ &= \text{Vect}(1, X, \dots, X^n). \end{aligned}$$

2 Opérations sur les polynômes

Pour $P = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k$, $Q = \sum_{k=0}^{+\infty} b_k X^k \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, on définit les lois $+$, \times , \cdot , \circ par

$$\blacksquare P + Q = \sum_{k=0}^{+\infty} (a_k + b_k) X^k$$

$$\blacksquare \lambda P = \sum_{k=0}^{+\infty} (\lambda a_k) X^k$$

$$\blacksquare P \times Q = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k X^k \times \sum_{\ell=0}^{+\infty} b_\ell X^\ell = \sum_{\substack{m=0 \\ (m=k+\ell)}}^{+\infty} c_m X^m$$

en faisant une sommation par diagonales, c'est-à-dire avec

$$c_m = \sum_{m=k+\ell} a_k b_\ell = \sum_{k=0}^m a_k b_{m-k} = \sum_{\ell=0}^m a_{m-\ell} b_\ell.$$

$$\blacksquare P \circ Q = P(Q) = \sum_{k=0}^{+\infty} a_k Q^k.$$

Propriété 1 : Opérations algébriques et degré

Si $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$, $P + Q$, $P \times Q$ et λP sont des polynômes et

- $\deg(P + Q) \leq \max(\deg P, \deg Q)$ avec égalité si et seulement si $\deg P \neq \deg Q$ ou $(\deg P = \deg Q \text{ et } \text{cd } P + \text{cd } Q \neq 0)$
- $\deg(\lambda P) = \deg P$ et $\text{cd}(\lambda P) = \lambda \text{cd } P$ si $\lambda \neq 0$, sinon $\lambda P = 0$.
- $\deg(PQ) = \deg P + \deg Q$ et $\text{cd}(PQ) = \text{cd } P \text{cd } Q$.
- Si Q **non constant**, alors

$$\begin{aligned} \text{et} \quad \deg(P \circ Q) &= \deg P \deg Q \\ \text{cd}(P \circ Q) &= \text{cd } P \times (\text{cd } Q)^{\deg P}. \end{aligned}$$

Propriété 2 : Structure d'algèbre commutative intègre

$(\mathbb{K}[X], +, \times, \cdot)$ est une \mathbb{K} -algèbre commutative intègre d'élément unité le polynôme constant 1 et dont le groupe des inversibles est $\mathbb{K}_0[X] \setminus \{0\}$ (polynômes constants non nuls.)



3 Dérivation formelle

Définition 1 : Polynôme dérivé

Si $P = a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n \in \mathbb{K}[X]$, on appelle **polynôme dérivé de P** , noté P' , le polynôme défini par

$$P' = \sum_{k=1}^n k a_k X^{k-1} = \sum_{k=0}^{n-1} (k+1) a_{k+1} X^k \\ = a_1 + 2a_2X + \dots + na_nX^{n-1}.$$

et $0' = 0$.

Plus généralement, on note $P^{(0)} = P$, $P^{(1)} = P'$, $P^{(2)} = P'' = (P')'$ et pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, $P^{(k)} = (P^{(k-1)})'$.

Propriété 3 : de la dérivation

Soient $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, $\alpha, \beta \in \mathbb{K}$.

- (i) $\deg P' = \deg P - 1$ si P non constant, $-\infty$ sinon.
Plus généralement, $\deg P^{(n)} = \deg P - n$ si $\deg P \geq n$, $-\infty$ sinon.
En général, $\deg P^{(n)} \leq \deg P - n$.
- (ii) **Linéarité** : $(\alpha P + \beta Q)' = \alpha P' + \beta Q'$.
- (iii) **Formule de Leibniz**
 $(PQ)' = P'Q + PQ'$ et plus généralement,
 $(PQ)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} P^{(k)} Q^{(n-k)}$.
- (iv) $(P \circ Q)' = Q' \times P' \circ Q$.

2 Formule de Taylor

Théorème 1 : Formule de Taylor

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ et $a \in \mathbb{K}$.

$$P(X) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\tilde{P}^{(n)}(a)}{n!} (X-a)^n$$

la somme étant finie, c'est-à-dire

$$P(X+a) = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\tilde{P}^{(n)}(a)}{n!} X^n.$$

Corollaire 1 : Formule de Mac Laurin

$P = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{\tilde{P}^{(n)}(0)}{n!} X^n$ c'est-à-dire les coefficients de P sont les $a_n = \frac{\tilde{P}^{(n)}(0)}{n!}$.

3 Racines

Définition 3 : Racine

$a \in \mathbb{K}$ est un **zéro** ou une **racine** de $P \in \mathbb{K}[X]$ lorsque $\tilde{P}(a) = 0$.

Propriété 5 : Racine et division

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

- (i) a est racine de P si et seulement si $(X-a) \mid P$.
- (ii) x_1, \dots, x_n sont racines deux à deux distinctes de P si et seulement si $(X-x_1) \cdots (X-x_n) \mid P$.

Corollaire 2 : Nombre de racines

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$.

- (i) Si $P \neq 0$, P admet au plus $\deg P$ racines.
- (ii) Si P admet strictement plus de $\deg P$ racines, $P = 0$.
- (iii) Si P admet une infinité de racines, $P = 0$.

Corollaire 3 : Identification polynôme et fonction polynôme

Si \mathbb{K} est infini et $\tilde{P} = \tilde{Q}$, alors $P = Q$. On peut alors confondre P et \tilde{P} .

II FONCTIONS POLYNOMIALES, RACINES

1 Fonctions polynomiales

Définition 2 : Fonction polynôme associée

Si $P = \sum_{k \geq 0} a_k X^k \in \mathbb{K}[X]$, on note

$\tilde{P} : \begin{cases} \mathbb{K} & \rightarrow \mathbb{K} \\ x & \rightarrow \tilde{P}(x) = \sum_{k \geq 0} a_k x^k \end{cases}$ appelée **fonction polynomiale associée à P** .

Propriété 4 : Fonction polynôme et opérations

- Si $P, Q \in \mathbb{K}[X]$ et $\lambda \in \mathbb{K}$
- (i) $\widetilde{P+Q} = \tilde{P} + \tilde{Q}$.
- (ii) $\widetilde{P \times Q} = \tilde{P} \times \tilde{Q}$.
- (iii) $\widetilde{\lambda P} = \lambda \tilde{P}$.
- (iv) $\widetilde{P \circ Q} = \tilde{P} \circ \tilde{Q}$.
- (v) Sur \mathbb{R} , \tilde{P} est dérivable et $\tilde{P}' = \tilde{P}'$.

Définition 4 : Multiplicité

Soient $P \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P \neq 0, a \in \mathbb{K}$.
On appelle **ordre de multiplicité** de a en tant que racine de P l'entier

$$m = \max \{ k \in \mathbb{N} ; (X - a)^k \mid P \}$$

Ainsi, a est racine d'ordre m si et seulement si $(X - a)^m \mid P$ et $(X - a)^{m+1} \nmid P$ si et seulement si on a $Q \in \mathbb{K}[X]$ tel que $P = (X - a)^m Q$ et $Q(a) \neq 0$.

- Si $m = 0$, a n'est pas racine de P .
- Si $m \geq 1$, a est racine de P .
- Si $m = 1$, a est racine simple de P .
- Si $m = 2$, a est racine double de P .
- Si $m = 3$, a est racine triple de P .
- Si $m \geq 2$, a est racine multiple de P .

Propriété 6

x_1, \dots, x_n deux à deux distincts sont racines d'ordre au moins m_1, \dots, m_n respectivement si et seulement si $(X - x_1)^{m_1} \dots (X - x_n)^{m_n} \mid P$.

Propriété 7 : Caractérisation de l'ordre

Soient $P \in \mathbb{K}[X], a \in \mathbb{K}, m \in \mathbb{N}$.
 a est racine d'ordre m de P si et seulement si $\forall k \in \llbracket 0, m - 1 \rrbracket, \tilde{P}^{(k)}(a) = 0$ et $\tilde{P}^{(m)}(a) \neq 0$.

Corollaire 4 : Multiplicité des racines de P vs P'

Si a est racine d'ordre $m \geq 2$ de P , a racine d'ordre $m - 1$ de P' . La réciproque est fautive si on ne suppose pas a racine de P .

4 Polynômes scindés

Définition 5 : Polynôme scindé

$P \in \mathbb{K}[X]$ est dit **scindé** sur \mathbb{K} s'il peut s'écrire comme produit de polynômes de degré 1 de $\mathbb{K}[X]$, c'est-à-dire si on a $\lambda \in \mathbb{K}^*, n \in \mathbb{N}^*$ et $y_1, \dots, y_n \in \mathbb{K}$ tels que

$$P = \lambda(X - y_1) \dots (X - y_n),$$

c'est-à-dire si on a $\lambda \in \mathbb{K}^*, p \in \mathbb{N}^*$ et $x_1, \dots, x_p \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts et $m_1, \dots, m_p \in \mathbb{N}^*$ tels que

$$P = \lambda(X - x_1)^{m_1} \dots (X - x_p)^{m_p}.$$

Alors $\deg P \geq 1, \lambda = \text{cd } P, x_1, \dots, x_p$ sont les racines de P deux à deux distinctes de multiplicités respectives m_1, \dots, m_p .

Propriété 8 : Caractérisation avec les racines

Soit P un polynôme non constant admettant exactement p racines d'ordres respectifs m_1, \dots, m_p dans \mathbb{K} . P est scindé si et seulement si

$$m_1 + \dots + m_p = \deg P.$$

Théorème 2 : Théorème de d'Alembert-Gauß (Théorème fondamental de l'algèbre)

Tout polynôme non constant de $\mathbb{C}[X]$ admet une racine.
On dit que le corps \mathbb{C} est **algébriquement clos**.

Corollaire 5 : Version alternative équivalente

Tout polynôme à coefficients complexes non constant est scindé.

Corollaire 6 : Divisibilité et racines

Si P est scindé, alors $P \mid Q$ si et seulement si toutes les racines de P sont racines de Q avec des multiplicités au moins égales à celles pour P .

5 Relations coefficients-racines

Définition 6 : Fonctions symétriques élémentaires

Soient $n \in \mathbb{N}^*, x_1, \dots, x_n \in \mathbb{K}$.
On appelle **fonctions symétriques élémentaires** de x_1, \dots, x_n les nombres

$$\sigma_1 = \sum_{i=1}^n x_i = x_1 + x_2 + \dots + x_n. \quad (n \text{ termes})$$

$$\sigma_2 = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \quad \left(\frac{n(n-1)}{2} \text{ termes} \right)$$

$$= x_1 x_2 + x_1 x_3 + \dots + x_1 x_n + \dots + x_{n-1} x_n.$$

⋮

$$\sigma_k = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} x_{i_2} \dots x_{i_k}. \quad \left(\binom{n}{k} \text{ termes} \right)$$

⋮

$$\sigma_n = x_1 x_2 \dots x_n. \quad (1 \text{ terme})$$

**Propriété 9 : Relations coefficients-racines**

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $a_0, \dots, a_n \in \mathbb{K}$ tel que $a_n \neq 0$, $P = a_0 + \dots + a_n X^n$, **scindé** sur \mathbb{K} , x_1, \dots, x_n ses racines **comptées avec leur multiplicité**, donc $P = a_n(X - x_1) \cdots (X - x_n)$. En notant σ_k les fonctions symétriques élémentaires en x_1, \dots, x_n ,

$$\blacksquare \sigma_1 = -\frac{a_{n-1}}{a_n}. \text{ (somme)}$$

$$\blacksquare \vdots$$

$$\blacksquare \sigma_k = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}.$$

$$\blacksquare \vdots$$

$$\blacksquare \sigma_n = (-1)^n \frac{a_0}{a_n}. \text{ (produit)}$$

Ainsi,

$$P = a_n \left(X^n - \underbrace{\sigma_1}_{\text{somme}} X^{n-1} + \sigma_2 X^{n-2} + \dots + (-1)^n \underbrace{\sigma_n}_{\text{produit}} \right).$$

Propriété 10 : Polynôme d'interpolation de Lagrange

Étant donné $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts et $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$, il existe un unique polynôme P de degré au plus n tel que $\forall i, P(x_i) = y_i$.

$$\text{Il s'agit de } P = \sum_{i=0}^n y_i \cdot L_i.$$

Comme le problème est linéaire (en fait affine), on peut le résoudre sur $\mathbb{K}[X]$ en passant par solution particulière et solution du problème homogène associé.

Propriété 11

Les polynômes d'interpolation associés aux points $((x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n))$ sont les polynômes

$$P + \left(\prod_{i=0}^n (X - x_i) \right) Q \text{ où } Q \in \mathbb{K}[X] \text{ et } P = \sum_{i=0}^n y_i L_i.$$

III INTERPOLATION DE LAGRANGE

- **Problématique** : Étant donné $n \in \mathbb{N}$, $n+1$ scalaires $x_0, \dots, x_n \in \mathbb{K}$ deux à deux distincts, et $y_0, \dots, y_n \in \mathbb{K}$ fixés (par exemple pour tout k , $y_k = f(x_k)$ où f est une fonction connue ou non).

On cherche des polynômes $P \in \mathbb{K}[X]$ tels que

$$\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket, P(x_k) = y_k.$$

C'est un problème d'**interpolation**.

- **Principe** : C'est un problème linéaire.

L'application $u : \begin{cases} \mathbb{K}_n[X] & \rightarrow \mathbb{K}^{n+1} \\ P & \rightarrow (P(x_k))_{k \in \llbracket 0, n \rrbracket} \end{cases}$ est une application linéaire injective entre deux espaces de dimension $n+1$.

En effet, son noyau est réduit aux polynômes de degré au plus n admettent les $n+1$ racines distinctes x_0, \dots, x_n , c'est-à-dire au polynôme nul.

Il s'agit donc d'un isomorphisme.

On peut aussi remarquer que sa matrice dans les bases canoniques est la matrice de Vandermonde associée à x_0, \dots, x_n .

Définition 7 : Polynômes de Lagrange

Si $n \in \mathbb{N}^*$ et x_0, \dots, x_n deux à deux distincts, on appelle i^{e} polynôme de Lagrange associé à (x_0, \dots, x_n) le polynôme

$$L_i = \frac{\prod_{j \neq i} (X - x_j)}{\prod_{j \neq i} (x_i - x_j)}.$$

IV ARITHMÉTIQUE SUR $\mathbb{K}[X]$ (MPI)

Dans cette partie, \mathbb{K} désigne un sous-corps de \mathbb{C} , comme, \mathbb{Q} , \mathbb{R} ou \mathbb{C} .

1 L'anneau $\mathbb{K}[X]$ **Propriété 12 : Description des polynômes associés**

Si $P, Q \in \mathbb{K}[X]$, P et Q sont associés si et seulement s'il existe $\lambda \in \mathbb{K}^*$ tel que $P = \lambda Q$.

Théorème 3 : Division euclidienne polynomiale

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ avec $B \neq 0$. Alors il existe un unique couple $(Q, R) \in \mathbb{K}[X]$ tel que $A = BQ + R$ et $\deg R < \deg B$.

Théorème 4 : $\mathbb{K}[X]$ est principal

L'anneau $\mathbb{K}[X]$ est principal.
En particulier, tout idéal de $\mathbb{K}[X]$ s'écrit sous la forme $P\mathbb{K}[X]$ avec $P \in \mathbb{K}[X]$. Si l'idéal est non nul, on peut choisir P de manière unique en le supposant unitaire.

2 PGCD de deux polynômes

Définition 8 : PGCD

Soient $A, B \in \mathbb{K}[X]$ non tous les deux nuls.

$$I = A\mathbb{K}[X] + B\mathbb{K}[X] = \{AU + BV, U, V \in \mathbb{K}[X]\}$$

est un idéal non réduit à zéro de $\mathbb{K}[X]$.

Son unique générateur unitaire est appelé pgcd de A et B , noté $A \wedge B$.

Propriété 13 : Relation de Bézout

Si $A, B \in \mathbb{K}[X]$, on peut trouver $U, V \in \mathbb{K}[X]$ tels que $AU + BV = A \wedge B$.

Propriété 14 : Caractérisation du PGCD

Soit $(A, B) \neq (0, 0)$.

$$D = A \wedge B \iff \begin{cases} D \text{ est unitaire} \\ D|A \text{ et } D|B \\ \forall C \in \mathbb{K}[X], (C|A \text{ et } C|B) \implies C|D \end{cases}$$

Il s'agit donc du plus grand diviseur unitaire au sens de la division.

Définition 9 : Polynômes premiers entre eux

$A, B \in \mathbb{K}[X]$ sont dits **premiers entre eux** lorsque $A \wedge B = 1$, c'est-à-dire lorsque les seuls diviseurs communs sont les polynômes constants non nuls.

Théorème 5 : de Bézout

Soit $A, B \in \mathbb{K}[X]$.

$$A \wedge B = 1 \iff \exists U, V \in \mathbb{K}[X], AU + BV = 1$$

Corollaire 7

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$.

- (i) $A \wedge BC = 1 \iff A \wedge B = A \wedge C = 1$
- (ii) Si $D = A \wedge B$, on a $A_1, B_1 \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A = DA_1, B = DB_1$ et $A_1 \wedge B_1 = 1$.

Théorème 6 : Lemme de Gauß

Soient $A, B, C \in \mathbb{K}[X]$.

Si $A|BC$ et $A \wedge B = 1$, alors $A|C$.

Propriété 15 : Cas des polynômes scindés

Si A ou B est **scindé**, $A \wedge B = 1 \iff A$ et B n'ont pas de racine commune.

3 PGCD d'une famille finie de polynômes

Soit $n \in \mathbb{N} \setminus \{0, 1\}$.

Définition 10 : pgcd de n polynômes

Soient $(A_1, \dots, A_n) \in (\mathbb{K}[X])^n \setminus \{(0, \dots, 0)\}$. On note $D = A_1 \wedge A_2 \wedge \dots \wedge A_n = \bigwedge_{k=1}^n A_k$ l'unique polynôme unitaire tel que $A_1\mathbb{K}[X] + \dots + A_n\mathbb{K}[X] = D\mathbb{K}[X]$.

Propriété 16

- (i) **Associativité** : $A \wedge B \wedge C = (A \wedge B) \wedge C = A \wedge (B \wedge C)$.
- (ii) Les diviseurs communs à A_1, \dots, A_n sont exactement les diviseurs de $\bigwedge_{k=1}^n A_k$.
- (iii) **Relation de Bézout** : On a $U_1, \dots, U_n \in \mathbb{K}[X]$ tels que $A_1U_1 + \dots + A_nU_n = \bigwedge_{k=1}^n A_k$.

Définition 11 : Polynômes premiers entre eux dans leur ensemble

A_1, \dots, A_n sont dits **premiers entre eux dans leur ensemble** lorsque $\bigwedge_{k=1}^n A_k = 1$, c'est-à-dire que le seul diviseur unitaire commun à tous les A_k est 1.

A_1, \dots, A_n sont dits **premiers entre eux deux à deux** lorsque $\forall i \neq j, A_i \wedge A_j = 1$.

Propriété 17

Premiers entre eux deux à deux \implies premiers entre eux dans leur ensemble, mais la réciproque est fautive pour plus de deux polynômes.

Théorème 7 : de Bézout

A_1, \dots, A_n sont premiers entre eux dans leur ensemble si et seulement si on a U_1, \dots, U_n tels que $A_1U_1 + \dots + A_nU_n = 1$.

**Propriété 18 : Diviseurs deux à deux premiers entre eux**

Si A_1, \dots, A_n sont premiers entre eux **deux à deux** et divisent B , alors $A_1 \cdots A_n | B$.

4 Polynômes irréductibles**Définition 12 : Polynôme irréductible**

On appelle **polynôme irréductible** tout polynôme $P \in \mathbb{K}[X]$ **non constant** dont les seuls diviseurs sont les λ et λP pour $\lambda \in \mathbb{K}^*$, c'est-à-dire tels que $P = UV \implies U$ ou V inversible.

Les autres polynômes sont dits **réductibles**.

Propriété 19 : des polynômes irréductibles

Soit P un polynôme irréductible, et $A, A_1, \dots, A_n \in \mathbb{K}[X]$.

- (i) Soit $P|A$, soit $P \wedge A = 1$.
- (ii) $P|A_1 \cdots A_n \iff \exists i$ tel que $P|A_i$.

Théorème 8 : Décomposition en produit d'irréductibles

Tout $A \in \mathbb{K}[X] \setminus \{0\}$ s'écrit de manière unique à l'ordre des facteurs près sous la forme

$$A = \lambda P_1^{\alpha_1} \cdots P_k^{\alpha_k}$$

où $k \in \mathbb{N}$, $\lambda \in \mathbb{K}^*$, P_1, \dots, P_k irréductibles deux à deux distincts unitaires, $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{N}^*$.

Alors $\lambda = \text{cd} A$, P_1, \dots, P_k sont les diviseurs irréductibles unitaires de A .

Propriété 20 : Irréductibles de $\mathbb{C}[X]$

Les irréductibles de $\mathbb{C}[X]$ sont les polynômes de degré 1.

5 Irréductibles sur $\mathbb{R}[X]$ **Propriété 21 : Racine complexe de polynôme réel**

Soit $P \in \mathbb{R}[X]$. alors si $\alpha \in \mathbb{C}$ est racine de P , $\bar{\alpha}$ l'est aussi, de même ordre.

Propriété 22 : Irréductibles de $\mathbb{R}[X]$

Les polynômes irréductibles de $\mathbb{R}[X]$ sont les polynômes de degré 1 et les polynômes de degré 2 sans racine réelle (à discriminant strictement négatif).

Propriété 23 : Expression du PGCD en produit d'irréductibles

Si $A = \lambda P_1^{\alpha_1} \cdots P_k^{\alpha_k}$ et $B = \mu P_1^{\beta_1} \cdots P_k^{\beta_k}$ décompositions en irréductibles (avec exposants éventuellement nuls), alors

$$A \wedge B = P_1^{\min(\alpha_1, \beta_1)} \cdots P_k^{\min(\alpha_k, \beta_k)}.$$

6 PPCM (Complément)**Définition 13 : PPCM**

Le PPCM de deux polynômes A, B non nuls est l'unique générateur unitaire $A \vee B$ de l'idéal $A\mathbb{K}[X] \cap B\mathbb{K}[X]$ des multiples communs à A et à B .

On a donc $A\mathbb{K}[X] \cap B\mathbb{K}[X] = (A \vee B)\mathbb{K}[X]$.
On peut poser $0 \vee 0 = 0$.

Propriété 24 : du PPCM

- (i) Il s'agit du plus petit multiple unitaire commun à A et à B au sens de la division.
- (ii) Si $A = \lambda P_1^{\alpha_1} \cdots P_k^{\alpha_k}$ et $B = \mu P_1^{\beta_1} \cdots P_k^{\beta_k}$ décompositions en irréductibles (avec exposant éventuellement nuls), alors $A \vee B = P_1^{\max(\alpha_1, \beta_1)} \cdots P_k^{\max(\alpha_k, \beta_k)}$.
- (iii) On a toujours que AB et $(A \wedge B)(A \vee B)$ sont associés (donc égaux à normalisation près).

**DÉCOMPOSITION EN ÉLÉMENTS SIMPLES****1 Partie entière****Définition – Propriété 1 : Partie entière**

Soit $F \in \mathbb{K}(X)$.

On note $\mathbb{K}^-(X) = \{F \in \mathbb{K}(X) \mid \deg F < 0\}$.

Il existe un unique couple $(Q, G) \in \mathbb{K}[X] \times \mathbb{K}^-(X)$ tel que $F = Q + G$. Q est appelé **partie entière** de F .

2 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$

Théorème 9 : Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{C}(X)$

Soit $F \in \mathbb{C}(X)$, $F = \frac{A}{B}$ sous forme irréductible, $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ pôles de F d'ordre m_1, \dots, m_n :

$$F = \frac{A}{\prod_{k=1}^n (X - \alpha_k)^{m_k}}$$

et $Q \in \mathbb{C}[X]$ la partie entière de F .

Alors il existe une unique famille $(\lambda_{k,j})_{\substack{1 \leq k \leq n \\ 1 \leq j \leq m_k}}$

de complexes telle que

$$F = \underbrace{Q}_{\text{partie entière}} + \underbrace{\frac{\lambda_{1,1}}{X - \alpha_1} + \dots + \frac{\lambda_{1,m_1}}{(X - \alpha_1)^{m_1}}}_{\text{partie polaire associée à } \alpha_1} + \dots + \underbrace{\frac{\lambda_{n,1}}{X - \alpha_n} + \dots + \frac{\lambda_{n,m_n}}{(X - \alpha_n)^{m_n}}}_{\text{partie polaire associée à } \alpha_n}$$

Propriété 25 : Partie polaire relative à un pôle simple

Si α pôle simple de $F = \frac{A}{B}$ sous forme irréductible, $\frac{\lambda}{X - \alpha}$ avec $\lambda \in \mathbb{C}$ la partie polaire associée à α . Alors $F = \frac{A}{(X - \alpha)B_1}$ avec $B_1(\alpha) \neq 0$ et

$$\lambda = \lim_{X \rightarrow \alpha} (X - \alpha)F = \frac{A(\alpha)}{B_1(\alpha)} = \frac{A(\alpha)}{B'(\alpha)}$$

Propriété 26 : Partie polaire relative à un pôle d'ordre ≥ 2

Si α pôle d'ordre $m \geq 2$ de $F = \frac{A}{B}$ sous forme irréductible,

$$F = \frac{A}{B} = \frac{A}{(X - \alpha)^m B_1} = \frac{\lambda_1}{X - \alpha} + \dots + \frac{\lambda_m}{(X - \alpha)^m} + G$$

où $B_1(\alpha) \neq 0$ et α n'est pas pôle de G .

Alors $\lambda_m = \lim_{X \rightarrow \alpha} \frac{A(X)}{(X - \alpha)^m} = \frac{A(\alpha)}{B_1(\alpha)}$ et $F - \frac{\lambda_m}{(X - \alpha)^m}$ admet α comme pôle d'ordre au plus $m - 1$ ce qui permet de réitérer le processus.



Méthode 1

Les deux propriétés précédentes permettent de trouver les coefficients de la décomposition.

Lorsqu'il reste peu de coefficients à calculer, on peut aussi essayer d'évaluer la fraction rationnelle en des points bien choisis ou utiliser des méthodes d'analyse réelle (limite en ∞ de $x^m F(x)$...)

Penser à exploiter la parité avec l'unicité des coefficients!

3 Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$

Théorème 10 : Décomposition en éléments simples dans $\mathbb{R}(X)$

Soit $F \in \mathbb{R}(X)$, $F = \frac{A}{B}$ sous forme irréductible, avec la décomposition de B en facteur irréductibles dans \mathbb{R} : $F = \frac{A}{\prod_{k=1}^p (X - x_k)^{m_k} \prod_{i=1}^r (X^2 + p_i X + q_i)^{n_i}}$ et $Q \in \mathbb{R}[X]$ la partie entière de F .

Alors il existe d'unique familles $(\lambda_{k,j})_{\substack{1 \leq k \leq p \\ 1 \leq j \leq m_k}}$,

$(\mu_{i,\ell})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq \ell \leq n_i}}$ et $(v_{i,\ell})_{\substack{1 \leq i \leq r \\ 1 \leq \ell \leq n_i}}$ de réels tels que

$$F = \underbrace{Q}_{\text{partie entière}} + \underbrace{\sum_{k=1}^p \left(\sum_{j=1}^{m_k} \frac{\lambda_{k,j}}{(X - x_k)^j} \right)}_{\text{partie polaire associée à } x_k} + \sum_{i=1}^r \underbrace{\left(\sum_{\ell=1}^{n_i} \frac{\mu_{i,\ell} X + v_{i,\ell}}{(X^2 + p_i X + q_i)^\ell} \right)}_{\text{partie polaire associée à } X^2 + p_i X + q_i}$$



Méthode 2

Les méthodes vues dans \mathbb{C} s'appliquent pour les pôles réels. Pour les μ et v , on peut appliquer la méthode « du cache » en α racine complexe de $X^2 + pX + q$.

On peut aussi décomposer dans \mathbb{C} et rassembler les pôles complexes non réels et leur conjugué. L'écriture $F = \bar{F}$ et l'unicité des coefficients donne des relations entre ceux-ci (comme avec la parité).



4 Décomposition en éléments simples de P'/P

Propriété 27 : Décomposition en éléments simples de P'/P

Soit $P \in \mathbb{K}[X]$ **scindé**, $P = \lambda \prod_{k=1}^p (X - x_k)^{m_k}$. Alors

la décomposition en éléments simples de $\frac{P'}{P}$ est donnée par

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^p \frac{m_k}{X - x_k}.$$

Variante : si $P = \lambda \prod_{k=1}^n (X - y_k)$ où les y_k sont les racines **comptées avec multiplicité**, alors

$$\frac{P'}{P} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{X - y_k}.$$