

**ECOLE POLYTECHNIQUE
ECOLES NORMALES SUPERIEURES**

CONCOURS D'ADMISSION 2021

**LUNDI 12 AVRIL 2021
08h00 - 12h00**

FILIERE MP - Epreuve n° 1

MATHEMATIQUES A (XLCR)

Durée : 4 heures

*L'utilisation des calculatrices n'est pas
autorisée pour cette épreuve*

Sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$

Ce sujet traite de l'étude des cardinaux possibles pour les sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$. Le but est de démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}^*$, il existe une borne (ne dépendant que de n) sur le cardinal des sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$, d'en expliciter une, et d'en donner une majoration raffinée dans le cas des sous-groupes dont le cardinal est une puissance d'un nombre premier.

Les préliminaires contiennent des résultats pouvant être utiles dans toute la suite du sujet.

Les parties 1, 2 et 3 sont indépendantes. La partie 4 est largement indépendante des autres, mais utilise le résultat de la dernière question de la partie 3.

Notations

- Les lettres \mathbb{N} , \mathbb{Z} , \mathbb{Q} , \mathbb{R} , \mathbb{C} désignent respectivement l'ensemble des entiers naturels, des entiers relatifs, des nombres rationnels, des nombres réels, des nombres complexes. La notation \mathbb{N}^* désigne l'ensemble des entiers naturels non nuls.
- Si $x \in \mathbb{R}$, on note $[x]$ la partie entière de x , c'est-à-dire le plus grand entier k tel que $k \leq x$.
- Si E est un ensemble fini, on note $\text{card}(E)$ son cardinal.
- Si $a, b \in \mathbb{Z}$, on note $b \mid a$ si b divise a , et $b \nmid a$ dans le cas contraire.
- Si $a, a', b \in \mathbb{Z}$, on note $a \equiv a' \pmod{b}$ si $b \mid (a' - a)$.
- Si $q \geq 2$ est un nombre premier et $a \in \mathbb{Z}$, on note $v_q(a)$ le plus grand entier v tel que $q^v \mid a$.
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, \mathfrak{S}_n désigne le groupe des permutations de l'ensemble $\{1, \dots, n\}$, et $\varepsilon : \mathfrak{S}_n \rightarrow \{\pm 1\}$ désigne le morphisme signature.
- Pour $k, n \in \mathbb{N}$, on notera $\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$ le nombre de parties à k éléments dans un ensemble à n éléments.
- Tous les anneaux considérés dans ce sujet sont unitaires.
- Si R est un anneau commutatif et $n \in \mathbb{N}^*$, on définit $\mathcal{M}_n(R)$ comme l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans R . On pourra utiliser librement le fait que l'addition coefficient par coefficient et la multiplication matricielle munissent $\mathcal{M}_n(R)$ d'une structure d'anneau.
- Si R est un anneau commutatif et $A \in \mathcal{M}_n(R)$, en notant $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ les coefficients de A , on définit la trace de A par la formule $\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$ et le déterminant de A par la formule $\det A = \sum_{\sigma \in \mathfrak{S}_n} \varepsilon(\sigma) \prod_{1 \leq i \leq n} a_{i\sigma(i)}$. On pourra utiliser librement le fait que pour $A, B \in \mathcal{M}_n(R)$, $\det(AB) = (\det A)(\det B)$.
- Si $n \in \mathbb{N}^*$ et R est un anneau commutatif, pour tout $A \in \mathcal{M}_n(R)$ on note $\chi_A = \det(XI_n - A)$ le polynôme caractéristique de A .

- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{C})$ désigne l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans \mathbb{C} , et $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ désigne le groupe multiplicatif des matrices inversibles de taille n à coefficients dans \mathbb{C} .
- Pour $n \in \mathbb{N}^*$, $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ désigne l'ensemble des matrices carrées de taille n à coefficients dans \mathbb{Z} , et $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ désigne le sous-groupe de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ constitué des matrices $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ inversibles dont l'inverse est dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$ (on ne demande pas de démontrer que cet ensemble est bien un sous-groupe de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$).
- Si G est un groupe d'élément neutre e , on rappelle qu'un élément g de G est dit d'ordre fini s'il existe un entier $d > 0$ tel que $g^d = e$. Dans ce cas, l'ordre de g est le plus petit entier $d > 0$ tel que $g^d = e$.
- Si $z \in \mathbb{C}$ et $d \in \mathbb{N}^*$, on dit que z est une racine d -ième de l'unité si $z^d = 1$. S'il existe $d \in \mathbb{N}^*$ tel que $z \in \mathbb{C}$ soit une racine d -ième de l'unité, on dira simplement que z est une racine de l'unité.

Préliminaires

1. Soit $z \in \mathbb{C}$ une racine de l'unité. Justifier que $|z| = 1$.
2. Soit $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$, et soit $d \in \mathbb{N}^*$. On suppose que g est d'ordre d . Démontrer que g est diagonalisable, et que toutes ses valeurs propres sont des racines d -ièmes de l'unité.
3. Soit $m \in \mathbb{N}$, et soit $q \in \mathbb{N}^*$.
 - (a) Démontrer que $\text{card}(\{1 \leq k \leq m \text{ tels que } q \mid k\}) = \lfloor \frac{m}{q} \rfloor$.
 - (b) En déduire que si q est premier, $v_q(m!) = \sum_{i=1}^{+\infty} \lfloor \frac{m}{q^i} \rfloor$.

1 Éléments d'ordre fini de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$

Le but de cette partie est de démontrer que l'ensemble des ordres possibles pour les éléments d'ordre fini de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ est fini.

On commence par détailler le cas $n = 2$. Soit $g \in \mathbf{GL}_2(\mathbb{Z})$. On suppose que g est d'ordre fini $d \in \mathbb{N}^*$.

1. Démontrer que $|\text{Tr}(g)| \leq 2$.
2. On suppose que les valeurs propres de g sont réelles, déterminer les valeurs possibles pour d .
3. On suppose maintenant que g n'a pas de valeurs propres réelles. Démontrer que le polynôme caractéristique de g est l'un des polynômes suivants : $X^2 + 1, X^2 + X + 1, X^2 - X + 1$.
4. En déduire que $d \in \{1, 2, 3, 4, 6\}$.

On traite maintenant le cas de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ où $n \geq 1$ est un entier quelconque.

5. Soit $P = X^n + \sum_{i=0}^{n-1} a_i X^i \in \mathbb{C}[X]$ unitaire de degré n . On note z_1, \dots, z_n les racines de P (comptées avec multiplicité) et $\alpha = \max_{1 \leq i \leq n} |z_i|$. Démontrer que pour tout $0 \leq i \leq n-1$, $|a_i| \leq \binom{n}{i} \alpha^{n-i}$.
6. Montrer que $\{\chi_g \text{ tels que } g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{Z}) \text{ est d'ordre fini}\}$ est fini.
7. En déduire que $\{d \in \mathbb{N} \mid \exists g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{Z}) \text{ d'ordre } d\}$ est fini.

2 Sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Le but de cette partie est de majorer le cardinal des sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ par une quantité ne dépendant que de n .

1. Soit $m \geq 3$ un entier. Soit $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$. On suppose que g est d'ordre fini et que $g - I_n$ a tous ses coefficients divisibles par m . Soit $A = (g - I_n)/m$.
 - (a) Montrer que A est diagonalisable sur \mathbb{C} , et que pour toute valeur propre λ de A , on a $|\lambda| < 1$.
 - (b) En déduire qu'il existe $k \in \mathbb{N}$ tel que $A^k = 0$.
 - (c) Conclure que $g = I_n$.
2. Soit G est un sous-groupe fini de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$, et soit $m \geq 3$ un entier.

- (a) Démontrer que l'application $\mathcal{M}_n(\mathbb{Z}) \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$ de réduction modulo m des coefficients induit une application injective $G \rightarrow \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}/m\mathbb{Z})$.
- (b) En déduire que $\text{card}(G) \leq 3^{n^2}$.

3 Traces des éléments d'un p -sous-groupe de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$

Soit p un nombre premier et $r \geq 1$ un entier. Dans cette partie, on suppose que G est un sous-groupe de cardinal p^r de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$. Le but de cette partie est de déterminer l'ensemble des valeurs possibles pour les traces des éléments de G .

1. Soit ℓ un nombre premier.
 - (a) Démontrer que pour tout $1 \leq k \leq \ell - 1$, l'entier $\binom{\ell}{k}$ est multiple de ℓ .
 - (b) Soit R un anneau. On note $\ell R = \{\ell x, x \in R\}$. Démontrer que pour tous $x, y \in R$ tels que $xy = yx$, on a $(x + y)^\ell - (x^\ell + y^\ell) \in \ell R$.
2. Soit R un anneau commutatif, et soit I un idéal de R . Soient $n \in \mathbb{N}^*$ et $A, B \in \mathcal{M}_n(R)$. On suppose que tous les coefficients de B sont dans l'idéal I . Démontrer que $\det(A + B) - \det A \in I$.
3. Soit $\ell \in \mathbb{N}$ un nombre premier. Démontrer que pour tout polynôme $P \in \mathbb{Z}[X]$, on a :

$$P(X^\ell) - P(X)^\ell \in \ell\mathbb{Z}[X].$$

4. Soit $M \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z})$, et soit $\ell \in \mathbb{N}$ un nombre premier.
 - (a) Justifier qu'il existe $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{Z}[X])$ telle que $(XI_n - M)^\ell - (X^\ell I - M^\ell) = \ell A$.
 - (b) Démontrer que $\chi_{M^\ell}(X^\ell) - \chi_M(X)^\ell \in \ell\mathbb{Z}[X]$
 - (c) En déduire que $\text{Tr}(M^\ell) \equiv \text{Tr}(M) \pmod{\ell}$.
5. Soit $g \in G$. Démontrer que $\text{Tr}(g) \equiv n \pmod{p}$.
6. Soit $g \in G$ et soit ℓ un nombre premier. On suppose que $\ell > 2n$. Démontrer que $\text{Tr}(g^\ell) = \text{Tr}(g)$.
7. Soit $k \in \mathbb{N}$ non divisible par p . On note

$$m = k + p^r \prod_{\substack{\ell \text{ premier} \\ \ell \leq 2n \\ \ell \text{ ne divise pas } k}} \ell.$$

- (a) Justifier que tous les facteurs premiers de m sont strictement supérieurs à $2n$.
 - (b) En déduire que pour tout $g \in G$, $\text{Tr}(g^k) = \text{Tr}(g)$.
8. On note $J_r = \{1 \leq k \leq p^r - 1 \text{ tels que } p \nmid k\}$.
 - (a) Démontrer que $J_r = \bigcup_{0 \leq s \leq p^r - 1} \{ps + t \text{ tels que } 1 \leq t \leq p - 1\}$.
 - (b) Soit $\zeta \in \mathbb{C}$ tel que $\zeta^{p^r} = 1$. Montrer que :

$$\sum_{j \in J_r} \zeta^j = \begin{cases} p^{r-1}(p-1) & \text{si } \zeta = 1 \\ -p^{r-1} & \text{si } \zeta \text{ est d'ordre } p \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}.$$

9. Soit $g \in G$. On note n_0 la multiplicité de 1 comme racine de χ_g , et n_1 le nombre de racines ζ de χ_g d'ordre p (comptées avec multiplicité). Démontrer que $\text{Tr}(g) = n_0 - \frac{n_1}{p-1}$.
10. On note $a = \lfloor \frac{n}{p-1} \rfloor$. Soit $g \in G$, démontrer que $\text{Tr}(g) \in \{n - pv \mid 0 \leq v \leq a\}$.

4 Cardinaux des p -sous-groupes de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$

Soit $G \subset \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ un sous-groupe fini. Dans cette partie, on démontre que pour tout $s \in \mathbb{N}$, $\sum_{g \in G} \text{Tr}(g)^s$ est un entier divisible par $\text{card}(G)$. On en déduit une borne uniforme sur le cardinal des sous-groupes finis de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ dont le cardinal est une puissance d'un nombre premier.

1. Soit $G \subset \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ un sous-groupe fini. Soit $f = \frac{1}{\text{card}(G)} \sum_{g \in G} g \in \mathcal{M}_n(\mathbb{C})$.
 - (a) Démontrer que f est un projecteur sur $\{x \in \mathbb{C}^n \mid \forall g \in G, g(x) = x\}$.
 - (b) En déduire que $\sum_{g \in G} \text{Tr}(g)$ est un entier divisible par $\text{card}(G)$.
2. Soient $k, n \in \mathbb{N}^*$. Pour $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ et $h \in \mathbf{GL}_k(\mathbb{C})$, on note $g \otimes h$ la matrice par blocs, de taille $nk \times nk$, définie par :

$$g \otimes h = \begin{pmatrix} g_{11}h & g_{12}h & \cdots & g_{1n}h \\ g_{21}h & \cdots & \cdots & g_{2n}h \\ \vdots & & & \vdots \\ g_{n1}h & \cdots & \cdots & g_{nn}h \end{pmatrix}.$$

Justifier les affirmations suivantes :

- (i) si $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ et $h \in \mathbf{GL}_k(\mathbb{C})$, $\text{Tr}(g \otimes h) = \text{Tr}(g)\text{Tr}(h)$.
- (ii) si $g, g' \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ et $h, h' \in \mathbf{GL}_k(\mathbb{C})$, $(g \otimes h)(g' \otimes h') = gg' \otimes hh'$.
- (iii) si $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$ et $h \in \mathbf{GL}_k(\mathbb{C})$, $g \otimes h \in \mathbf{GL}_{nk}(\mathbb{C})$ et $(g \otimes h)^{-1} = g^{-1} \otimes h^{-1}$.
3. Soient Γ, Γ' des groupes finis et $\varphi : \Gamma \rightarrow \Gamma'$ un morphisme de groupes. Soit $H = \ker \varphi$.
 - (a) Soit $\gamma' \in \Gamma'$. Démontrer que $\varphi^{-1}(\{\gamma'\})$ est vide ou de la forme $\gamma H = \{\gamma h \mid h \in H\}$ pour un certain $\gamma \in \Gamma$.
 - (b) Démontrer que $\text{card}(\Gamma) = \text{card}(\varphi(\Gamma))\text{card}(H)$.
4. Pour $g \in \mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$, on définit par récurrence sur s : $g^{(1)} = g$ et $g^{(s+1)} = g^{(s)} \otimes g$. Soit $s \geq 1$, on définit l'application :

$$\begin{aligned} \varphi_s : \mathbf{GL}_n(\mathbb{C}) &\rightarrow \mathbf{GL}_{n^s}(\mathbb{C}). \\ g &\mapsto g^{(s)}. \end{aligned}$$

Soit G un sous-groupe fini de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{C})$.

- (a) Justifier que φ_s est un morphisme de groupes et démontrer que :

$$\sum_{g \in G} \text{Tr}(g)^s = \text{card}(G \cap \ker \varphi_s) \sum_{g' \in \varphi_s(G)} \text{Tr}(g').$$

- (b) En déduire que $\sum_{g \in G} \text{Tr}(g)^s$ est un entier divisible par $\text{card}(G)$.

Soit p un nombre premier et soit $r \in \mathbb{N}^*$. Soit G un sous-groupe de $\mathbf{GL}_n(\mathbb{Z})$ de cardinal p^r .

5. On rappelle qu'on a noté $a = \left\lfloor \frac{n}{p-1} \right\rfloor$. Pour $1 \leq j \leq a$, on note $\tau_j = n - pj$, et $P(X) = \prod_{1 \leq j \leq a} (X - \tau_j)$.
 - (a) En considérant $\sum_{g \in G} P(\text{Tr}(g))$, démontrer que $\text{card}(G)$ divise $P(n)$.
 - (b) En déduire que $r \leq a + v_p(a!)$.
6. (a) Démontrer que $r \leq \frac{pn}{(p-1)^2}$.
 - (b) En déduire que $\text{card}(G) \leq 4^n$.