

TD * SÉRIES ENTIÈRES

1 X Soit $(u_n)_{n \geq 0}$ une suite de nombres complexes. On définit $S_n = \sum_{k=0}^n u_k$.

Comparer les rayons de convergence des séries entières $\sum \frac{u_n}{n!} x^n$ et $\sum \frac{S_n}{n!} x^n$.

2 Un lemme utile Montrer que la série entière $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ a un rayon de convergence non nul si et seulement s'il existe $\alpha > 0$ et $M > 0$ tels que

$$\forall n \in \mathbb{N}, \quad |a_n| \leq M \alpha^n$$

Ce lemme est utile lorsqu'une suite (a_n) est donnée par une relation de récurrence. On trouve $\alpha > 0$ tel que l'inégalité $|a_n| \leq M \alpha^n$ soit récurrente. On ajuste M pour que cette inégalité soit vraie pour les petites valeurs de n .

Si une suite (a_n) vérifie

$$\forall n \geq 2, \quad a_n = \frac{a_{n-1}}{n} + 2a_{n-2}$$

montrer que $\sum_{n \geq 0} a_n z^n$ a un rayon de convergence non nul.

3 Mines-Ponts – Fonctions complexes analytiques

Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence R strictement positif. On note f sa somme.

1. Soit r un élément de $]0, R[$.

(a) Démontrer que, pour tout entier naturel n ,

$$a_n = \frac{1}{2\pi r^n} \int_0^{2\pi} f(re^{i\theta}) e^{-in\theta} d\theta$$

(b) On note alors $M(r) = \sup_{|z|=r} |f(z)|$ dont on admet l'existence (une histoire de fonction continue sur un compact... cf plus tard!). Majorer $|a_n|$ à l'aide de $r, n, M(r)$.

(c) Que peut-on dire d'une série entière dont le rayon de convergence est infini et dont la somme est bornée ?

2. (a) Montrer que pour $0 < r < R$,

$$\sum_{n=0}^{+\infty} |a_n|^2 r^{2n} = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} |f(re^{i\theta})|^2 d\theta.$$

(b) Que dire de f si $|f|$ admet un maximum local en 0 ?

(c) On suppose maintenant que $R = +\infty$ et qu'il existe $P \in \mathbb{R}_N[X]$ tel que $|f(z)| \leq P(|z|)$ pour tout z complexe. Montrer que $f \in \mathbb{C}_N[X]$ (ce qui généralise 1.(c)).

On pourra étudier la limite lorsque $r \rightarrow +\infty$ du reste d'ordre N évalué en r et divisé par r^{2p} pour plusieurs valeurs de p .

4 Mines-Ponts Démontrer que ϕ définie par

$$\phi(x) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n(n-1)} x^n$$

est continue sur $[-1, 1]$, et exprimer ϕ au moyen des fonctions usuelles (on utilisera deux méthodes : dérivation, et décomposition en éléments simples).

5 Centrale – Décomposition en série entière d'une fonction rationnelle

1. Soit a un nombre complexe non nul. Montrer que la fonction $z \mapsto \frac{1}{z-a}$ est développable en série entière sur un disque ouvert centré en 0. Donner ce développement, et son rayon de convergence.

2. En déduire que, si m est un entier naturel non nul et a un complexe non nul, $z \mapsto \frac{1}{(z-a)^m}$ est développable en série entière sur $D(0, |a|)$. Calculer les coefficients de ce développement.

3. Soit F une fraction rationnelle complexe n'admettant pas 0 pour pôle. En utilisant la décomposition en éléments simples de F , démontrer que F est développable en série entière au voisinage de 0. Quel est le rayon de convergence de cette série entière ? (on l'exprimera en fonction des modules des pôles de F)

4. On écrit F sous forme irréductible : $F = P/Q$. En écrivant $QF = P$, démontrer que la suite des coefficients du développement en série entière de F vérifie, à partir d'un certain rang, une relation de récurrence linéaire.

5. Pour $n \in \mathbb{N}$, soit a_n le nombre de solutions de l'équation $x+2y+5z = n$, d'inconnue $(x, y, z) \in \mathbb{N}^3$. Montrer, si $|z| < 1$, que

$$\frac{1}{(1-z)(1-z^2)(1-z^5)} = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$$

6. Donner un équivalent de a_n quand $n \rightarrow +\infty$.

6 ENS Démontrer que $x \mapsto \frac{x}{e^x - 1}$ est développable en série entière, ses coefficients étant rationnels.

7 ENS Soit des séries entières $\sum a_n z^n$ et $\sum b_n z^n$ de rayons de convergence non nuls, de sommes respectives $f(z)$ et $g(z)$.

1. Montrer que le rayon de convergence de $\sum a_n b_n z^n$ est non nul. On note $h(z)$ la somme de cette série entière.

2. Montrer l'existence d'un voisinage V de 0 dans \mathbb{C} tel que

$$\forall (z, z') \in V^2, \quad h(zz') = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} f(ze^{i\theta}) g(z'e^{-i\theta}) d\theta$$

8 ENS Soit $\sum a_n z^n$ une série entière de rayon de convergence $R > 0$, q dans \mathbb{C}^* tel que

$|q| < R$ et $(b_n)_{n \geq 0} \in (\mathbb{C}^*)^{\mathbb{N}}$ telle que $b_n \sim q b_{n+1}$. Déterminer la limite de la suite de terme général

$$u_n = \frac{1}{b_n} \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}.$$

9 Centrale

On note I_n le nombre d'involutions de $[[1, n]]$ et on convient que $I_0 = 1$.

1. Démontrer que, si $n \geq 1$, alors

$$I_{n+1} = I_n + nI_{n-1}$$

2. Démontrer que la série entière $S(x) = \sum_{n \geq 0} \frac{I_n}{n!} x^n$ converge pour tout x dans $] -1, 1[$.

On note S sa somme.

3. Justifier que, pour tout $x \in] -1, 1[$, on a $S'(x) = (1+x)S(x)$.

4. En déduire une expression de $S(x)$, puis de I_n .

10 Centrale Déterminer le rayon de convergence de la série entière $\sum_{n \geq 1} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \frac{x^n}{n!}$ puis

déterminer un équivalent de sa somme quand x tend vers $+\infty$.

11 X Etant donné une suite de carré sommable (a_n) , on pose $f(t) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{a_n}{n-t}$ où la variable t

est réelle.

1. Préciser le domaine de définition de f .

2. Montrer que f est développable en série entière autour de 0.

3. Montrer que si f est identiquement nulle sur $[-1/2, 1/2]$, la suite (a_n) l'est.

12 X-ENS – Théorèmes taubériens Soit $(a_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{C}^{\mathbb{N}}$ telle que $f(x) = \sum_{n=0}^{+\infty} a_n x^n$ existe pour tout

$x \in] -1, 1[$ et $f(x) \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} \ell \in \mathbb{C}$. Démontrer que la série $\sum a_n$ converge et a pour somme ℓ dans les cas suivants :

1. $\forall n \in \mathbb{N}, a_n \geq 0$

3. $\sum n|a_n|^2$ converge

2. $a_n = o\left(\frac{1}{n}\right)$

4. $\frac{a_1 + 2a_2 + \dots + na_n}{n} \rightarrow 0$

13 Formules de Newton et application à la méthode de Fadeev-Leverrier de calcul du polynôme caractéristique d'une matrice carrée

Soit $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ les racines (complexes, pas nécessairement distinctes) du polynôme caractéristique χ_A de la matrice carrée d'ordre n (réelle ou complexe) A . On note

$$\chi_A(t) = t^n - p_1 t^{n-1} - \dots - p_n$$

et, pour tout entier naturel k supérieur ou égal à 1 :

$$s_k = \lambda_1^k + \dots + \lambda_n^k.$$

1. On veut démontrer que les p_i et les s_k sont liés entre eux par les formules suivantes, dites de Newton :

$$\text{si } 1 \leq k \leq n : k p_k = s_k - p_1 s_{k-1} - \dots - p_{k-1} s_1 ;$$

$$\text{si } k \geq n+1 : s_k = p_1 s_{k-1} + \dots + p_n s_{k-n}.$$

(a) On définit, si $u \in \mathbb{C}$,

$$f(u) = \prod_{i=1}^n (1 - u \lambda_i)$$

Montrer que la fonction $\frac{f'}{f}$ est développable en série entière au voisinage de 0.

(b) Développer le polynôme $f(u)$ en exprimant ses coefficients à l'aide de p_1, \dots, p_n .

(c) Conclure.

2. Démontrer que, pour tout $k \geq 1$:

$$s_k = \text{tr} A^k$$

3. On construit deux suites de matrices et une suite de nombres par l'algorithme suivant :

$$\begin{array}{lll} A_1 = A & q_1 = \text{tr} A_1 & B_1 = A_1 - q_1 I_n \\ A_2 = AB_1 & 2q_2 = \text{tr} A_2 & B_2 = A_2 - q_2 I_n \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ A_n = AB_{n-1} & nq_n = \text{tr} A_n & B_n = A_n - q_n I_n \end{array}$$

(a) Montrer que les q_k sont les p_k en utilisant les formules de Newton.

(b) Montrer que B_n est nulle.

4. On définit enfin le polynôme matriciel

$$Q(t) = t^{n-1} I_n + t^{n-2} B_1 + \dots + B_{n-1}$$

et on suppose connue une valeur propre λ de A . Démontrer que chaque colonne non nulle de la matrice $Q(\lambda)$ est un vecteur propre de la matrice A .

14 Formule de Ramanujan

On se propose d'établir la formule suivante, due à Ramanujan, et dont la première démonstration était basée sur les fonctions elliptiques :

$$\frac{1}{\pi} = \frac{3}{16} + \frac{9}{4} \sum_{k=1}^{+\infty} \left(\frac{\binom{2k-2}{k-1}}{k} \right)^2 \frac{4k^2 - 1}{2^{4k}(k+1)^2}.$$

On admettra les formules de Wallis, démontrées dans un exercice d'intégration :

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{2k} x \, dx = \frac{\pi}{2} \frac{\binom{2k}{k}}{2^{2k}} \quad \text{et} \quad \left(\frac{2n}{2^{2n}} \right)_{n \rightarrow +\infty} \sim \frac{1}{\sqrt{n\pi}}.$$

En effectuant un calcul direct de l'intégrale d'une part, en utilisant le développement en série entière de $\sqrt{1+u}$ d'autre part, démontrer l'égalité suivante, pour tout x de l'intervalle $[0, 1[$:

$$\int_0^x t \sqrt{1-t^2} \, dt = \frac{1}{3} (1 - (1-x^2)^{\frac{3}{2}}) = \frac{x^2}{2} - \sum_{j=2}^{+\infty} \frac{\binom{2j-4}{j-2}}{(j-1)2^{2j-3}} \frac{x^{2j}}{2j}.$$

Puis justifier que cette égalité est encore vraie pour $x = 1$. On remplace alors x par $\sin u$ dans l'égalité, et on intègre entre 0 et $\frac{\pi}{2}$. Montrer que l'on obtient la formule annoncée.

Des formules dues à Ramanujan, la suivante est sans doute l'une des plus belles :

$$\pi = \frac{9801}{\sqrt{8}} \left(\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(4n)!(1103 + 26390n)}{(n!)^4 (396)^{4n}} \right)^{-1}$$