

ESPACES PRÉHILBERTIENS RÉELS

- Faire des dessins.
- Pour montrer qu'une application est un produit scalaire, pas de secret : symétrie, linéarité (à gauche ou à droite), définie-positivité. Ne pas oublier de vérifier que l'application est bien définie, lorsque ce n'est pas immédiat.
- Lors de calculs avec des normes euclidiennes, on utilise souvent $\| \cdot \|$ et on peut faire intervenir le produit scalaire.
- Pour établir une inégalité faisant intervenir norme et produit scalaire on pensera à utiliser les inégalités de Cauchy-Schwarz et Minkowski (inégalité triangulaire).
- Pour montrer qu'un vecteur est nul, on peut montrer qu'il est orthogonal à tout vecteur, ou encore qu'il est orthogonal à lui-même. (Et deux vecteurs sont égaux si leur différence est le vecteur nul !)
- Faire des dessins en dimension 2 ou 3 peut être une bonne idée pour "visualiser" ce que l'on veut démontrer.
- Jusqu'à présent, lorsque l'on devait démontrer qu'un extremum était atteint, on pensait à des arguments de continuité et compacité. Pour l'unicité, souvent les arguments sont de convexité ou de calcul de dérivée (ou de différentielle) pour la recherche de points critiques. Il faut maintenant penser, pour des problèmes de minimum, au théorème de projection sur un sous-espace de dimension finie. Si on pense que c'est cela qu'il faut appliquer, on définit un produit scalaire convenable et un sous-espace qui permet de résoudre le problème.
- Les problèmes de polynômes orthogonaux interviennent dans de nombreux énoncés.
- L'orthonormalisation de Gram-Schmidt peut parfois être remplacée par une orthogonalisation, plus légère. Il faut avoir présente à l'esprit l'interprétation de l'orthonormalisation de Gram-Schmidt en termes de projection orthogonale.

Exercices vus en cours

- 1** Montrer qu'on définit sur $\mathbb{R}[X]$ un produit scalaire en posant $(P|Q) = \int_0^{+\infty} e^{-t} P(t)Q(t) dt$, et en confondant polynôme et fonction polynomiale associée.
- 2** Définir sur $\mathbb{R}_n[X]$, puis $\mathbb{R}[X]$, un produit scalaire rendant la base canonique orthonormale.
- 3** Si I est un intervalle et $L^2(I)$ est l'ensemble des fonctions continues sur I telles que f^2 est intégrable, montrer que $L^2(I)$ est un \mathbb{R} -espace vectoriel, et que $(f|g) = \int_I fg$ définit un produit scalaire sur $L^2(I)$.
- 4** Si $\ell^2(\mathbb{R})$ est l'ensemble des suites réelles de carré sommable (ie terme général de série – absolument – convergente) montrer qu'il s'agit d'un \mathbb{R} -espace vectoriel, et que $(u|v) = \sum_{n=0}^{+\infty} u_n v_n$ définit un produit scalaire sur $\ell^2(\mathbb{R})$.
- 5** CCINP 76 – 79
- 6** Orthonormaliser la base $e_1 = (0, 1, 1)$, $e_2 = (1, 0, 1)$, $e_3 = (1, 1, 0)$ de \mathbb{R}^3 muni de sa structure eucl-

dienne canonique.

- 7** Dans $E = \mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ muni de sa structure euclidienne canonique, soit F le sous-espace vectoriel des fonctions polynomiales.
1. Montrer que $F^\perp = \{0\}$ en utilisant le théorème de Weierstraß.
 2. En déduire que $F \not\subseteq (F^\perp)^\perp = E$.
 3. Soit $G = \{t \mapsto P(t)\sin(t); P \in F\}$. Montrer que $G^\perp = \{0\}$ et en déduire que $(F \cap G)^\perp \not\supseteq F^\perp + G^\perp$.
 4. Montrer que $d\left(\exp, x \mapsto \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}\right) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$. Que vaut $d(\exp, F)$? Est-elle atteinte?
 5. Montrer plus généralement que si $d(f, F)$ est atteinte pour un $g \in F$, alors $f - g \in F^\perp$. Pour quelles fonctions est-ce le cas?

8 CCINP 39 – 77

- 9** $\mathcal{S}_n(\mathbb{R})$ et $\mathcal{A}_n(\mathbb{R})$ sont supplémentaires orthogonaux dans $\mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ pour le produit scalaire canonique.

10 CCINP 92 – 80

- 11** Soit $E = \mathbb{R}^3$, P le plan d'équation cartésienne $x - z = 0$. On note $\mathcal{B} = (e_1, e_2, e_3)$ la base canonique de \mathbb{R}^3 . Quelle est la matrice dans \mathcal{B} de la projection orthogonale sur P et de la symétrie orthogonale par rapport à p ?

12 CCINP 81 – 82

- 13** Déterminer les équations des bissectrices, dans un repère orthonormal du plan, de $\mathcal{D} : 3x + 4y = 0$ et $\mathcal{D}' : 5x - 12y = 0$.

Produit scalaire

14 Le retour des polynômes de Tchebychev

1. Vérifier que l'égalité suivante définit un produit scalaire sur l'espace des fonctions polynômes réelles $(P, Q)_2 = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} P(t)Q(t) dt$.
On rappelle que les polynômes de Tchebychev sont définis par la relation, valable pour tout n entier naturel et tout réel θ , $T_n(\cos \theta) = \cos n\theta$. Démontrer que la famille $(T_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est une famille orthogonale ce produit scalaire.
2. Soit E l'espace $C([-1, 1], \mathbb{R})$. Montrer que, si $(f, g) \in E^2$, $\langle f, g \rangle_2 = \int_{-1}^1 \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} f(t)g(t) dt$ est bien défini. Montrer que l'on construit ainsi un produit scalaire sur E .

15 Soient f et g des applications de E dans E telles que $\forall (x, y) \in E^2, (f(x)|y) = (x|g(y))$.
Montrer que f et g sont linéaires.

16 Vérifier que l'égalité suivante définit un produit scalaire sur l'espace des fonctions polynômes réelles :

$$\langle P, Q \rangle = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} P(t) Q(t) dt$$

- Démontrer qu'il existe une unique suite orthogonale de polynômes $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$, tels que pour tout n , P_n soit unitaire (i.e. de coefficient dominant égal à 1) de degré n .
- Démontrer qu'il existe deux suites (λ_n) et (μ_n) de réels telles que, pour tout entier naturel $n \geq 2$, $P_n = (X - \lambda_n)P_{n-1} - \mu_n P_{n-2}$
(Indication : décomposer $X P_{n-1}$ dans la base des P_k).

On définit les polynômes de Hermite par $H_n(x) = (-1)^n e^{x^2} h_n^{(n)}(x)$ où $h_n(x) = e^{-x^2}$.

On peut montrer qu'ils forment une famille orthonormale pour ce produit scalaire. Quitte à les diviser par leur coefficient dominant 2^n , on obtient les polynômes P_n .

17 **Écrit Mines – CCINP** On considère le produit scalaire $\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(t) Q(t) dt$ sur $\mathbb{R}[X]$.

- Vérifier qu'il s'agit bien d'un produit scalaire.
- Montrer qu'il existe une suite orthonormale $(P_n)_{n \in \mathbb{N}}$ d'éléments de $\mathbb{R}[X]$ telle que $\deg(P_n) = n$ pour tout n .
- Soit $n \geq 2$. On suppose que P_n possède k racines de multiplicité impaire dans $]0, 1[$, a_1, \dots, a_k , avec $k < n$.

(a) Vérifier que, si $Q = \prod_{i=1}^k (X - a_i)$, alors $\langle P_n | Q \rangle = 0$

(b) En écrivant $\langle P_n | Q \rangle$ sous forme intégrale, aboutir à une contradiction.

(c) Démontrer que P_n est scindé à racines simples, et que ses racines sont toutes dans $]0, 1[$.

- On fixe $n \in \mathbb{N}^*$. Soit a_1, \dots, a_n les racines de P_n . Montrer qu'il existe des réels $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ tels que, pour tout $P \in \mathbb{R}_{n-1}[X]$, on ait

$$\int_0^1 P(t) dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(a_i)$$

Donner une expression de ces scalaires en fonction des intégrales sur $[0, 1]$ des L_k , où les L_k désignent les polynômes interpolateurs de Lagrange associés à la famille (a_1, \dots, a_n) .

- On reprend les notations de la question précédente. En utilisant la division euclidienne par P_n , montrer que

$$\forall P \in \mathbb{R}_{2n-1}[X] \quad \int_0^1 P(t) dt = \sum_{i=1}^n \lambda_i P(a_i).$$

Ce type de résultat est à la base des méthodes de Gauss pour les calculs approchés d'intégrales.

18 Soit E l'ensemble des fonctions continues de $[-1, 1]$ dans \mathbb{R} muni de son produit scalaire canonique. Soient \mathcal{P} et \mathcal{I} les parties de E contenant les fonctions paires et impaires respectivement.

Montrer que $\mathcal{I} = \mathcal{P}^\perp$ et déterminer la symétrie orthogonale par rapport à \mathcal{P} .

19 Étudier la nature de la série de terme général $u_n = \frac{1}{n^2 (\sqrt{2})^n} \sum_{k=0}^n \sqrt{\binom{n}{k}}$.

20 Soient $n \in \mathbb{N}^*$, x_1, \dots, x_n des nombres réels. Montrer que $(x_1 + \dots + x_n)^2 \leq n(x_1^2 + \dots + x_n^2)$.
Dans quel(s) cas a-t-on égalité ?

21 Soient a et b deux vecteurs unitaires d'un espace euclidien E de dimension $n \geq 2$ et de produit scalaire noté $\langle \cdot | \cdot \rangle$. On étudie l'endomorphisme f de E donné par

$$f(x) = x - \langle a | x \rangle \cdot b.$$

- À quelle condition simple l'endomorphisme f est-il bijectif ?
- À quelle condition l'endomorphisme f est-il diagonalisable ?

22 Soit $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$ vérifiant $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \|AX\| \leq \|X\|$ où $\|\cdot\|$ désigne la norme euclidienne usuelle sur l'espace des colonnes.

- Établir $\forall X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}), \|A^T X\| \leq \|X\|$.
- Soit $X \in \mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R})$. Montrer que si $AX = X$ alors $A^T X = X$.
- Établir $\mathcal{M}_{n,1}(\mathbb{R}) = \text{Ker}(A - I_n) \oplus \text{Im}(A - I_n)$.

Projection orthogonale

23 On se place dans \mathbb{R}^3 muni de son produit scalaire usuel, noté $\langle \cdot | \cdot \rangle$. Soit D la droite d'équation $x = -y = z$, s la symétrie orthogonale par rapport à D et p le projecteur orthogonal sur D .

- Déterminer les matrices de s et p dans la base canonique de \mathbb{R}^3 .
- Considérons les applications f et g définies sur $\mathbb{R}^3 \times \mathbb{R}^3$ par :

$$f(x, y) = \langle x | p(y) \rangle \quad \text{et} \quad g(x, y) = \langle x | s(y) \rangle.$$

Démontrer que f et g sont des formes bilinéaires symétriques. Sont-elles définies positives ?

24 **Oral Mines** Soit $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ un espace euclidien, p un projecteur de E .

Montrer que p est un projecteur orthogonal si et seulement si $\forall x \in E, \|p(x)\| \leq \|x\|$.

Distance à un sous-espace

25 Dans l'espace vectoriel \mathbb{R}^4 , on définit $v_1 = (1, 2, -1, 1)$, $v_2 = (0, 3, 1, -1)$ et $F = \text{Vect}(v_1, v_2)$.

1. Déterminer un système d'équations (dans la base canonique) et une base orthonormale de F^\perp .
2. Soit $e_1 = (1, 0, 0, 0)$. Calculer $d(e_1, F)$.

26 Calculer, pour $A \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$, $\inf_{M \in \mathcal{S}_n(\mathbb{R})} \left(\sum_{i,j \in \llbracket 1, n \rrbracket} (a_{i,j} - m_{i,j})^2 \right)$

27 Pour tous réels a, b, c , on pose $I(a, b, c) = \int_{-1}^1 (x^3 - ax^2 - bx - c)^2 dx$. Démontrer qu'il existe un unique triplet (a, b, c) tel que $I(a, b, c)$ soit minimum et le déterminer.

28 **Déterminants de Gram – grand classique de l'oral et de l'écrit**

Si u_1, \dots, u_n sont n vecteurs d'un espace préhilbertien réel $(E, \langle \cdot, \cdot \rangle)$, on définit leur matrice de Gram, $G(u_1, \dots, u_n)$, comme la matrice carrée d'ordre n dont le coefficient en ligne i et colonne j est $\langle u_i, u_j \rangle$.

1. Démontrer que si la famille (u_1, \dots, u_n) est liée alors le déterminant de sa matrice de Gram est nul (on pourra commencer par supposer que u_n s'écrit comme combinaison linéaire des autres u_i).
2. On suppose maintenant (u_1, \dots, u_n) libre, et on considère (e_1, \dots, e_n) une base orthonormale de $\text{Vect}(u_1, \dots, u_n)$. On note :

$$A = \text{Mat}_{(e_1, \dots, e_n)}(u_1, \dots, u_n).$$

- (a) Exprimer $G = G(u_1, \dots, u_n)$ à l'aide d'un produit faisant intervenir A et sa transposée.
 - (b) Montrer que le déterminant de G est strictement positif.
3. On suppose la famille (u_1, \dots, u_n) libre ; on désigne par F le s.e.v. engendré par (u_1, \dots, u_n) , et par x un vecteur de E . Démontrer :

$$[d(x, F)]^2 = \frac{\det(G(u_1, \dots, u_n, x))}{\det(G(u_1, \dots, u_n))}$$

On pourra par exemple, dans le calcul de $\det(G(u_1, \dots, u_n, x))$ écrire $x = (x-z) + z$, z désignant le projeté orthogonal de x sur F .