

## Intégrales généralisées

$\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

On souhaite généraliser la notion d'intégrale à des intervalles qui ne sont pas des segments.

### I

#### INTÉGRALE GÉNÉRALISÉE SUR UN INTERVALLE DE LA FORME $[a, +\infty[$

Soit  $a \in \mathbb{R}$  fixé.

##### 1 Intégrale convergente en $+\infty$

###### Définition 1 : Intégrale convergente en $+\infty$

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $[a, +\infty[$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$ . On dit que  $\int_a^{+\infty} f$  est **convergente** lorsque

Dans ce cas, on note  $\int_a^{+\infty} f(t) dt$  ou  $\int_a^{+\infty} f$  cette limite.

###### Remarque

R1 – Lorsque  $\int_a^{+\infty} f$  diverge, l'objet  $\int_a^{+\infty} f(t) dt$  n'a aucun sens... sauf dans le cas où  $f$  est à valeurs réelles positives (cf partie suivante).

###### Exemple

$$\text{E1} - \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t^2}$$

$$\text{E2} - \int_0^{+\infty} \frac{dt}{1+t}$$

###### Propriété 1 : Intégrales de Riemann

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . L'intégrale dite de Riemann  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$  converge si et seulement si

###### Propriété 2 : Intégrales exponentielles

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . L'intégrale  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$  converge si et seulement si

###### Exercice 1 : Cas particulier d'intégrales de Bertrand


Donner une condition nécessaire et suffisante sur le réel  $\beta$  pour que l'intégrale  $\int_2^{+\infty} \frac{dt}{t(\ln t)^\beta}$  converge.

###### Remarque


R2 –  $\triangleleft$   $\sum u_n$  converge  $\Rightarrow u_n \rightarrow 0$ . Ce n'est plus le cas pour la convergence de  $\int_a^{+\infty} f$ .

Par exemple, si on considère la fonction  $f$  nulle partout sauf entre  $n$  et  $n + \frac{2}{n^2}$  où

elle dessine un triangle isocèle de hauteur 1, d'aire  $\frac{1}{n^2}$  pour tout  $n \geq 2$ . Alors  $f \geq 0$ ,  $\int_a^x f \leq \sum_{n=2}^{\lfloor x \rfloor} \frac{1}{n^2} \leq \frac{\pi^2}{6} - 1$  et  $x \mapsto \int_a^x f$  est croissante donc  $\int_a^{+\infty} f$  converge, et pourtant  $f(x) \neq 0$  lorsque  $x \rightarrow +\infty$ .



On peut même construire une fonction  $f$  non bornée dont l'intégrale converge : il suffit que les triangles soient de hauteur  $n$  et de base  $\frac{2}{n^3}$ .



Par contre, si  $f$  a une limite non nulle, l'intégrale diverge.

### Propriété 3 : Linéarité

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{K})$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$ , telles que  $\int_a^{+\infty} f$  et  $\int_a^{+\infty} g$  convergent.

Alors  $\int_a^{+\infty} (f + \lambda g)$  converge et

$$\int_a^{+\infty} (f + \lambda g) = \int_a^{+\infty} f + \lambda \int_a^{+\infty} g.$$

### Propriété 4 : Choix de la borne inférieure

### Propriété 5 : Dérivation de $x \mapsto \int_x^{+\infty} f$

Soient  $f \in \mathcal{C}([a, +\infty[, \mathbb{K})$  tel que  $\int_a^{+\infty} f$  converge.  
Alors

## 2 Cas des fonctions réelles positives

### Propriété 6 : Cas des fonctions réelles positives

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ .

Alors  $F: x \mapsto \int_a^x f(t) dt$

$\int_a^{+\infty} f$  converge si et seulement si

### Définition 2 : Intégrale de fonction positive

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ .

On pose  $\int_a^{+\infty} f$  la limite finie ou  $+\infty$  de  $F: x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  en  $+\infty$ .

### Remarque

R3 – On se permet donc d'écrire  $\int_a^{+\infty} f = +\infty$  en cas de divergence, **seulement dans le cas où  $f$  est à valeurs réelles positives.**

**Théorème 1 : Convergence d'intégrales de fonctions positives par comparaison**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ , tel que

**H1**

**H2** L'une des trois hypothèses suivantes est vérifiée

alors

**C1**

**Remarque**

R4 – Similaire aux séries.

Il est indispensable que les fonctions soient à valeurs positives !

**Théorème 2 : Divergence d'intégrales de fonctions positives par comparaison**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ , tel que

**H1**

**H2** L'une des trois hypothèses suivantes est vérifiée

alors

**C1**

**Théorème 3 : Convergence d'intégrales de fonctions positives par équivalent**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$  telles que  $f \sim_{+\infty} g$ . Alors

**3 Intégrabilité sur un intervalle de la forme  $[a, +\infty[$** **Définition 3 : Fonction intégrable**

Une fonction  $f$  est dite **intégrable** sur  $[a, +\infty[$  lorsqu'elle est continue par morceaux sur  $[a, +\infty[$  et que

On dit aussi que  $\int_a^{+\infty} f$  est **absolument convergente**.

On note  $f \in L^1([a, +\infty[, \mathbb{K})$ .

**Exemple**

E3 – **Intégrales de Riemann** :  $x \mapsto \frac{1}{x^\alpha}$  est intégrable sur  $[1, +\infty[$  si et seulement si  $\alpha > 1$ .

E4 – **Intégrales exponentielles** :  $x \mapsto e^{-\alpha x}$  est intégrable sur  $[0, +\infty[$  si et seulement si  $\alpha > 0$ .

**Théorème 4 : l'absolue convergence entraîne la convergence**

Si  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$ , alors  $\int_a^{+\infty} |f|$  converge.

La réciproque est fausse en général mais vrai pour des fonctions de signe constant.

**Remarque**

R5 – Le programme stipule que « Un calcul montrant que  $\int_a^{+\infty} |f| < +\infty$  vaut preuve d'intégrabilité. »

C'est puissant ! On peut travailler dans  $[0, +\infty]$  lorsque la fonction est positive, et obtenir l'intégrabilité lorsque le résultat n'est pas  $+\infty$ .

R6 – Une intégrale  $\int_a^{+\infty} f$  convergente mais non absolument convergente et dite semi-convergente.

R7 – Comme on l'a vu avec cet exemple, dans la pratique, pour procéder à une intégration par partie, on se ramène à une borne finie  $x$  puis on passe à la limite. Cela éviter de risquer d'écrire des termes qui n'existent pas. Voir plus loin.



### Théorème 5 : Intégrabilité par comparaison

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ .

■ On suppose que

H1  $g$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$

H2 L'une des trois hypothèses suivantes est vérifiée

Au voisinage de  $+\infty$ ,  $f \leq g$  ou  $f = \underset{+\infty}{\mathcal{O}}(g)$  ou  $f = \underset{+\infty}{o}(g)$ ,

alors

C1  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$ .

■ Si  $f \underset{+\infty}{\sim} g$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$  si et seulement si  $g$  l'est.

Exercice 2 : CCINP 25 question 1. : Démontrer que, pour tout entier naturel  $n$ , la fonction

$t \mapsto \frac{1}{1+t^2+t^n e^{-t}}$  est intégrable sur  $[0, +\infty[$ .

Exercice 3 : Montrer que  $x \mapsto \frac{x^2+3x+1}{x^4+x^2+1}$  est intégrable sur  $[0, +\infty[$ .

Exercice 4 : Montrer que  $x \mapsto e^{-x^2}$  est intégrable sur  $[0, +\infty[$ .

### Remarque

R8 – Si les fonctions ne sont pas à valeurs positives, on met des valeurs absolues/modules.

Ainsi, si  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{K})$  tel que  $g$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$  et ( $f = \underset{+\infty}{\mathcal{O}}(g)$  ou  $f = \underset{+\infty}{o}(g)$ ), alors ( $|f| = \underset{+\infty}{\mathcal{O}}(|g|)$  ou  $|f| = \underset{+\infty}{o}(|g|)$ ) donc  $\int_a^{+\infty} |f|$  converge.

Et si  $f \sim g$ , alors  $|f| \sim |g|$  et  $\int_a^{+\infty} |f|$  converge si et seulement si  $\int_a^{+\infty} |g|$  converge.

Exercice 5 : Classique : intégrales de Bertrand

Montrer que  $f : x \mapsto \frac{1}{x^\alpha \ln^\beta x}$  est intégrable en  $+\infty$  si et seulement si  $\alpha > 1$  ou ( $\alpha = 1$  et  $\beta > 1$ ).

(Même résultat que sur les séries, mais c'est plus simple à démontrer.)

### Corollaire 1 : Intégrabilité par comparaison, cas général

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{K})$ .

■ On suppose que

H1  $g$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$

H2 L'une des trois hypothèses suivantes est vérifiée

Au voisinage de  $+\infty$ ,  $|f| \leq |g|$  ou  $f = \underset{+\infty}{\mathcal{O}}(g)$  ou  $f = \underset{+\infty}{o}(g)$ ,

alors

C1  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$ .

■ Si  $f \underset{+\infty}{\sim} g$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$  si et seulement si  $g$  l'est.

## 4 Comparaison série-intégrale (complément)

Le résultat suivant est désormais hors-programme mais intéressant.

Exercice 6

Soient  $n_0 \in \mathbb{N}$ ,  $f : [n_0, +\infty[ \rightarrow \mathbb{R}$  tel que

H1  $f$  est continue par morceaux,

H2  $f$  est décroissante,

H3  $f$  est positive

alors

C1  $\sum_{n \geq n_0} f(n)$  converge si et seulement si  $f$  est intégrable sur  $[n_0, +\infty[$ .

**II****INTÉGRALE GÉNÉRALISÉE SUR UN INTERVALLE QUELCONQUE****1 Cas d'un intervalle semi-ouvert**

On généralise les résultats précédents aux intervalles de la forme  $[a, b[$  ou  $]a, b]$  avec  $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  tels que  $a < b$ .

**Définition 4 : Intégrale convergente**

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $[a, b]$  (respectivement  $]a, b]$ ) à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On dit que  $\int_a^b f$  est **convergente** lorsque  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  a une limite finie en  $b$  (respectivement  $x \mapsto \int_x^b f(t) dt$  a une limite finie en  $a$ ).

Dans ce cas, on note  $\int_a^b f(t) dt$  ou  $\int_a^b f$  cette limite.

Lorsque  $f$  est à valeur réelles positives et que  $\int_a^b f(t) dt$  diverge, on note  $\int_a^b f(t) dt = +\infty$ .

On dit que  $f$  est **intégrable** sur  $[a, b[$  (respectivement  $]a, b]$ ) lorsque  $\int_a^b |f|$  converge, et on note  $f \in L^1([a, b[, \mathbb{K})$  (respectivement  $f \in L^1(]a, b], \mathbb{K})$ ).

**Remarque**

R 9 – On dit aussi que  $f$  est intégrable en  $b$  (respectivement en  $a$ ).

R 10 – Si la borne ouverte est finie et que  $f$  possède une limite finie au point, il suffit de faire un prolongement par continuité : on est ramené à une intégrale sur un segment.

Par exemple,  $\int_0^\pi \frac{\sin t}{t} dt$  converge sans problème.

R 11 – Le programme stipule que « Pour une fonction à valeurs dans  $\mathbb{R}^+$ , un calcul aboutissant à un résultat fini vaut preuve de convergence », comme dans le chapitre sur la sommabilité.

R 12 – Les anciens programmes parlaient d'intégrale **impropre** en  $b$ .

**Exemple**

E 5 –  $\tan$  n'est pas intégrable sur  $[0, \frac{\pi}{2}[$ .

**Propriété 7 : Intégrales de Riemann**

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

■  $x \mapsto \frac{1}{|x|^\alpha}$  est intégrable sur  $[1, +\infty[$  (respectivement  $]-\infty, -1]$ ) si et seulement si

■  $x \mapsto \frac{1}{|x|^\alpha}$  est intégrable sur  $]0, 1]$  (respectivement  $[-1, 0[$ ) si et seulement si

■ Pour  $\alpha = 1$ ,

**Exemple**

E 6 –  $\int_0^1 \frac{dt}{\sqrt{t}} \cdot \int_0^1 \frac{dt}{t} \text{ et } \int_0^1 \frac{dt}{t^2}$

**Théorème 6 : Intégrabilité par comparaison**

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, b[, \mathbb{K})$ .

■ Si  $g$  est intégrable sur  $[a, b[$  et que l'une des deux hypothèses suivantes est vérifiée :

Au voisinage de  $b$ ,  $|f| \leq |g|$  ou  $f = \underset{b}{\circ}(g)$  ou  $f = \underset{b}{o}(g)$ ,

alors  $f$  est intégrable sur  $[a, b[$ .

■ Si  $f \underset{b}{\sim} g$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a, b[$  si et seulement si  $g$  l'est.

On a un énoncé analogue sur  $]a, b]$  en comparant au voisinage de  $a$ .



### Propriété 8 : Indépendance du choix de l'autre borne

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $[a, b]$ ,  $c \in [a, b]$ .

Alors  $\int_a^b f$  converge si et seulement si  $\int_c^b f$  converge.

On a un résultat analogue pour une fonction continue par morceaux sur  $]a, b]$ .

### Propriété 9 : Cas d'une fonction prolongeable par continuité

Soit  $-\infty < a < b < +\infty$  et  $f$  continue par morceaux sur  $[a, b]$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On suppose que  $f$  a une limite finie en  $b$ , c'est-à-dire qu'elle est prolongeable par continuité en une fonction  $\tilde{f}$  continue par morceaux sur  $[a, b]$ .

Alors  $f$  est intégrable sur  $[a, b]$ .

On a un énoncé analogue sur  $]a, b]$ .

#### Remarque

R 13 – Les anciens programmes parlaient d'intégrale **faussement impropre**.

## 2 Cas d'un intervalle ouvert

### Définition 5 : Convergence d'intégrale et intégrabilité sur un intervalle ouvert

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $]a, b]$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On dit que  $\int_a^b f$  est **convergente** lorsqu'il existe  $c \in ]a, b[$  (qui est en fait quelconque d'après la propriété précédente) tel que  $\int_a^c f$  et  $\int_c^b f$  sont convergentes.

Dans ce cas, on note

$$\int_a^b f = \int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

On dit que  $f$  est **intégrable** sur  $]a, b[$  lorsque  $\int_a^b |f|$  converge et on note  $f \in L^1(]a, b[, \mathbb{K})$ .

### Exemple

E 7 – Pour tout  $\alpha \in \mathbb{R}$ ,  $\int_0^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$

#### Remarque

R 14 – Il faut démontrer la convergence des deux intégrales séparément !

### Exemple

E 8 –  $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \tan t dt$  diverge alors que pour tout  $x \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$ ,  $\int_{-x}^x \tan t dt = 0$ .

## 3

### Intégrabilité sur un intervalle quelconque

$I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  d'intérieur non vide.

### Théorème 7 : L'intégrabilité implique la convergence de l'intégrale

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $I$ . Si  $f$  est intégrable sur  $I$ , alors  $\int_I f$  converge.

### Propriété 10 : Espace vectoriel $L^1(I, \mathbb{K})$

- L'ensemble des fonctions continues par morceaux intégrables sur  $I$  a une structure de  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Cet espace vectoriel est noté  $L^1(I, \mathbb{K})$ .
- L'application  $f \mapsto \int_I f$  est une forme linéaire de cet espace.

#### Remarque

R 15 – Donc si  $f, g$  intégrables sur  $I$ , alors  $\int_I (\alpha f + \beta g) = \alpha \int_I f + \beta \int_I g$ .

R 16 – Comme pour les séries, il faut y réfléchir à deux fois avant de séparer une intégrale généralisée en deux : on a vite fait de manipuler des termes qui n'existent pas... Mais dans le cas des fonctions **positives**, le programme autorise de travailler dans  $[0, +\infty]$ .

R 17 – C'est encore le cas en prenant plus généralement les fonctions dont l'intégrale converge. Cependant, l'espace vectoriel en question n'a pas de nom particulier.

**Propriété 11 : Inégalité triangulaire**

*Si  $f$  est intégrable sur  $I$ ,*

**Propriété 12 : Cas des fonctions à valeurs complexes**

*Si  $f$  est à valeurs complexes,  $\int_I f$  converge si et seulement si  $\int_I \Re(f)$  et  $\int_I \Im(f)$  convergent.*

*Dans ce cas,  $\int_I f = \int_I \Re(f) + i \int_I \Im(f)$ .*

## 4 Étude et rédaction de l'existence d'une intégrale



**Méthode 1 : Étudier l'intégrabilité de  $f$  sur un intervalle  $I$  ou étudier la convergence de  $\int_a^b f$**

(ce n'est pas la même chose !)

**Position du problème**

- Si  $I$  est un segment, il n'y a pas de problème.
- Si  $I$  est un intervalle bornée sur lequel  $f$  est bornée, alors  $f$  est intégrable par comparaison à une fonction constante qui est intégrable. C'est le cas par exemple si la fonction est continue et prolongeable par continuité en une borne ouverte (et c'est alors encore plus simple à justifier : il suffit de considérer l'intégrale sur un segment du prolongement, qui ne présente pas de problème).
- Si  $I$  est un intervalle ouvert  $]a, b[$ , on étudie séparément l'existence de  $\int_a^c f$  et  $\int_c^b f$ . Le réel  $c$  est choisi quelconque dans  $]a, b[$  et on est ramené à une étude sur  $]a, c]$  et  $[c, b[$  (semi-ouverts).

**Cas des fonctions positives**

Dans ce cas, la convergence de l'intégrale est équivalente à l'intégrabilité. Bien insister dans la rédaction :

« La fonction  $f : x \mapsto \dots$  est continue (par morceaux), **positive** sur l'intervalle ... »

en précisant bien l'intervalle.

S'il est ouvert, on coupe en deux et on étudie **séparément** les deux intégrabilités.

**Cas des fonctions non positives**

... ni négatives.

Dans ce cas, on s'intéresse soit à l'intégrabilité (absolue convergence), soit à la (semi)-convergence de l'intégrale (mais cette dernière n'est pas un objectif du programme).

**Exercice 7 :  $x \mapsto \cos^3(1/x)$  sur  $]0, 1]$ .****Exercice 8 : Étudier l'existence de  $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$  où  $x \in \mathbb{R}$ .****Exercice 9 : Existence de  $\int_0^{+\infty} e^{-t} \sin(xt) dt$  pour  $x \in \mathbb{R}$ .****Remarque**

R 18 – Mauvaise rédaction :

$$\left| \int_0^x e^{-t} \sin(xt) dt \right| \leq \int_0^x e^{-t} dt \leq 1 \dots$$

Comme pour les séries, c'est à la fonction qu'on s'intéresse et non aux « intégrales partielles ».

**Exercice 10 : CCINP 28**



### III

## PROPRIÉTÉS DES INTÉGRALES GÉNÉRALISÉES

### 1 Relation de Chasles

La notion d'intégrale généralisée se... généralise au cas où les bornes ne sont pas dans le bon sens.

#### Propriété 13 : Relation de Chasles

Soit  $f \in \mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$  telle que  $\int_I f$  converge.

(i) Si  $J$  sous-intervalle de  $I$ , alors  $\int_J f$  converge.

(ii) Si  $a, b, c \in \bar{I}$  éventuellement infinis,

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f,$$

toutes ces intégrales étant bien convergentes.

### 2 Propriétés liées à l'ordre

#### Propriété 14 : liée à l'ordre

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m(I, \mathbb{R})$  telles que  $\int_I f$  et  $\int_I g$  convergent.

Positivité

Croissance

Intégrale nulle

De façon équivalente, si  $f$  est positive, continue, intégrable non identiquement nulle sur  $I$  alors

### 3

## Intégrale généralisée dépendant d'une borne

#### Propriété 15 : Dérisation

Les bornes ouvertes peuvent être éventuellement infinies.

Si  $f$  est continue sur  $[a, b[$  et si  $\int_a^b f$  converge, alors  $g : x \mapsto \int_x^b f(t) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b[$  et  $g' =$

Si  $f$  est continue sur  $]a, b]$  et si  $\int_a^b f$  converge, alors  $h : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]a, b]$  et  $h' =$

#### Remarque

R 19 – Se retrouve avec une primitive.

### IV

## CHANGEMENTS DE VARIABLE, INTÉGRATIONS PAR PARTIES

### 1 Changement de variable

#### Théorème 8 : Changement de variable

Soit  $\alpha, \beta, a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  et  $\varphi : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$  une bijection de classe  $\mathcal{C}^1$ . Alors  $\varphi$  est strictement monotone.

On suppose que  $\varphi(u) \xrightarrow[u \rightarrow \alpha]{} a$  et  $\varphi(u) \xrightarrow[u \rightarrow \beta]{} b$  (quitte à échanger les bornes des intervalles).

Alors  $\int_a^b f(t) dt$  et  $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$  sont de même nature. En cas de convergence, elles sont égales.

#### Remarque

R 20 – Même nature est à prendre au sens convergentes ou divergentes ou absolument convergentes ou semi-convergentes.

C'est donc très utile pour étudier la nature d'une intégrale généralisée.

- R 21 – Le programme autorise l'utilisation sans justification dans les cas usuels :  $\varphi$  fonction affine, puissance, exponentielle, logarithme.
- R 22 – Mais il vaut mieux insister. Faire un changement de variable avec une rédaction de la forme : « Changement de variable  $t = \varphi(u)$  où  $\varphi: \dots \rightarrow \dots$  bijective et de classe  $C^1$  ». On peut alors exprimer  $u = \varphi^{-1}(t)$ .
- R 23 – Sur un segment, la bijectivité n'était pas nécessaire, ici elle l'est.

**Exercice 11 :** Trouver un lien entre l'intégrale  $\int_0^{+\infty} e^{-t^2} dt$  et  $\int_0^{+\infty} \frac{e^{-t}}{\sqrt{t}} dt$ .

**Exercice 12 :** Exprimer, pour  $n \in \mathbb{N}$ ,  $\int_0^{+\infty} \frac{dt}{(1+t^2)^n}$  à l'aide des intégrales de Wallis

$$W_k = \int_0^{\pi/2} \sin^k t dt.$$

**Exercice 13 :** Déduire de l'étude des intégrales de Bertrand en  $+\infty$ , celle de ces mêmes intégrales en 0, à l'aide du changement de variable  $u = \frac{1}{t}$ .

### Propriété 16 : Intégrales de Riemann

Soit  $a \in \mathbb{R}$  et  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto \frac{1}{|x-a|^{\alpha}}$  est intégrable sur  $[b, a]$  (respectivement  $]a, b]$ ) si et seulement si

#### Remarque

R 24 – Plus généralement, via un changement de variable, la fonction  $f$  est intégrable en  $a$  (resp.  $b$ ) si et seulement si  $t \mapsto f(a+t)$  (resp.  $t \mapsto f(b-t)$ ) est intégrable en 0.

## 2 Intégration par parties

On ne fait pas d'intégration par partie sur des intégrales généralisées : on pourrait faire apparaître des termes qui n'existent pas.

Donc on repasse à une intégrale sur un segment, on intègre par parties puis on passe à la limite.

#### Remarque

R 25 – Le programme donne tout de même un résultat, qu'on évitera d'utiliser : si  $f$  et  $g$  ont des limites finies en  $a$  et en  $b$  (« si le crochet existe »), les intégrales  $\int_a^b f'g$  et  $\int_a^b fg'$  sont toutes les deux convergentes ou toutes les deux divergentes (mais seulement l'une peut être semi-convergente contrairement au changement de variable). Et en cas de convergence, on peut écrire

$$\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'$$

(ou le crochet est à prendre au sens des limites.)

Il est largement préférable, dans la pratique, de repasser par une intégration par partie classique sur un segment, avant de passer à la limite.

### Exemple

E 9 – Par exemple,

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \left[ \frac{-\cos t}{t} \right]_0^{+\infty} - \int_0^{+\infty} \frac{\cos t}{t^2} dt$$

n'est pas acceptable. On peut, en modifiant légèrement ce calcul, le rendre néanmoins exact, et en déduire la surprenante relation

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin t}{t} dt = \int_0^{+\infty} \left( \frac{\sin t}{t} \right)^2 dt.$$

(ce qui est encore plus surprenant, c'est que l'on a également  $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin^2 n}{n^2}$ .)

**Exercice 14 :** Si  $x > 0$ , on pose  $\Gamma(x) = \int_0^{+\infty} t^{x-1} e^{-t} dt$ . Trouver une relation entre  $\Gamma(n+1)$  et  $\Gamma(n)$  et en déduire  $\Gamma(n)$  pour tout  $n \in \mathbb{N}^*$ .



## V

## INTÉGRATION DES RELATIONS DE COMPARAISON

## Théorème 9 : Intégration des relations de comparaison

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$  et  $g \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{R}^+)$  une fonction à valeurs **réelles positives**.

**Cas de divergence** Si  $\int_a^b g$  diverge et

(i) si  $f = \mathcal{O}(g)$ , alors

(ii) si  $f = o_b(g)$ , alors

(iii) Si  $f \sim_b g$ , alors

**Cas de convergence** Si  $\int_a^b g$  converge et

(i) si  $f = \mathcal{O}(g)$ , alors  $f$  intégrable et

(ii) si  $f = o_b(g)$ , alors  $f$  intégrable et

(iii) Si  $f \sim_b g$ , alors  $f$  intégrable et

On a un énoncé analogue sur  $]a, b]$ .

Exercice 15 : Soit la fonction  $f : x \mapsto \int_1^x e^{t^2} dt$ .

1. Déterminer la limite de  $f(x)$  en  $+\infty$ .
2. Déterminer un équivalent de  $f$  en  $+\infty$ .

## Remarque

R 26 – Noter l'analogie avec les sommes partielles et les restes des séries.

R 27 – Comme pour les séries, la fonction de référence est toujours à valeurs réelles positives.