

## Intégrales généralisées

$\mathbb{K}$  désigne  $\mathbb{R}$  ou  $\mathbb{C}$ .

On souhaite généraliser la notion d'intégrale à des intervalles qui ne sont pas des segments.



### INTÉGRALE GÉNÉRALISÉE SUR UN INTERVALLE DE LA FORME $[a, +\infty[$

Soit  $a \in \mathbb{R}$  fixé.

#### 1 Intégrale convergente en $+\infty$

##### Définition 1 : Intégrale convergente en $+\infty$

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $[a, +\infty[$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$ . On dit que  $\int_a^{+\infty} f$  est **convergente** lorsque  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  a une limite finie en  $+\infty$ .

Dans ce cas, on note  $\int_a^{+\infty} f(t) dt$  ou  $\int_a^{+\infty} f$  cette limite.

##### Propriété 1 : Intégrales de Riemann

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . L'intégrale dite de Riemann  $\int_1^{+\infty} \frac{dt}{t^\alpha}$  converge si et seulement si  $\alpha > 1$ .

##### Propriété 2 : Intégrales exponentielles

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ . L'intégrale  $\int_0^{+\infty} e^{-\alpha t} dt$  converge si et seulement si  $\alpha > 0$ .

##### Propriété 3 : Linéarité

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{K})$ ,  $\lambda \in \mathbb{K}$ , telles que  $\int_a^{+\infty} f$  et  $\int_a^{+\infty} g$  convergent.

Alors  $\int_a^{+\infty} (f + \lambda g)$  converge et

$$\int_a^{+\infty} (f + \lambda g) = \int_a^{+\infty} f + \lambda \int_a^{+\infty} g.$$

##### Propriété 4 : Choix de la borne inférieure

Soient  $f \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{K})$ ,  $b \in [a, +\infty[$  alors  $\int_a^{+\infty} f$  et  $\int_b^{+\infty} f$  ont même nature.

Si elles convergent,  $\int_a^{+\infty} f = \int_a^b f + \int_b^{+\infty} f$ .

##### Propriété 5 : Dérivation de $x \mapsto \int_x^{+\infty} f$

Soient  $f \in \mathcal{C}([a, +\infty[, \mathbb{K})$  tel que  $\int_a^{+\infty} f$  converge.

Alors  $\varphi : x \mapsto \int_x^{+\infty} f$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, +\infty[$  et  $\varphi' = -f$ .

#### 2 Cas des fonctions réelles positives

##### Propriété 6 : Cas des fonctions réelles positives

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ .

Alors  $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est croissante, et  $\int_a^{+\infty} f$  converge si et seulement si  $F$  est majorée.

##### Définition 2 : Intégrale de fonction positive

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ .

On pose  $\int_a^{+\infty} f$  la limite finie ou  $+\infty$  de  $F : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  en  $+\infty$ .

##### Théorème 1 : Convergence d'intégrales de fonctions positives par comparaison

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ , tel que

H1  $\int_a^{+\infty} g$  converge

H2 L'une des trois hypothèses suivantes est vérifiée

Au v. de  $+\infty$ ,  $0 \leq f \leq g$  ou  $f = o(g)$  ou  $f = O(g)$ ,

alors

C1  $\int_a^{+\infty} f$  converge.

##### Théorème 2 : Divergence d'intégrales de fonctions positives par comparaison

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ , tel que

H1  $\int_a^{+\infty} g$  diverge

H2 L'une des trois hypothèses suivantes est vérifiée

Au v. de  $+\infty$ ,  $0 \leq g \leq f$  ou  $g = o(f)$  ou  $g = O(f)$ ,

alors

C1  $\int_a^{+\infty} f$  diverge.



### Théorème 3 : Convergence d'intégrales de fonctions positives par équivalent

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$  telles que  $f \underset{+\infty}{\sim} g$ . Alors  $\int_a^{+\infty} f$  et  $\int_a^{+\infty} g$  ont même nature.

### 3 Intégrabilité sur un intervalle de la forme $[a, +\infty[$

#### Définition 3 : Fonction intégrable

Une fonction  $f$  est dite **intégrable** sur  $[a, +\infty[$  lorsqu'elle est continue par morceaux sur  $[a, +\infty[$  et que  $\int_a^{+\infty} |f|$  est convergente.

On dit aussi que  $\int_a^{+\infty} f$  est **absolument convergente**.

On note  $f \in L^1([a, +\infty[, \mathbb{K})$ .

#### Théorème 4 : l'absolue convergence entraîne la convergence

Si  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$ , alors  $\int_a^{+\infty} f$  converge.

La réciproque est fausse en général mais vrai pour des fonctions de signe constant.

#### Théorème 5 : Intégrabilité par comparaison

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{R}^+)$ .

■ On suppose que

**H1**  $g$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$

**H2** L'une des trois hypothèses suivantes est vérifiée

Au v. de  $+\infty$ ,  $f \leq g$  ou  $f = \underset{+\infty}{\circ}(g)$  ou  $f = \underset{+\infty}{\circ_0}(g)$ ,

alors

**C1**  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$ .

■ Si  $f \underset{+\infty}{\sim} g$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$  si et seulement si  $g$  l'est.

#### Corollaire 1 : Intégrabilité par comparaison, cas général

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, +\infty[, \mathbb{K})$ .

■ On suppose que

**H1**  $g$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$

**H2** L'une des trois hypothèses suivantes est vérifiée

Au v. de  $+\infty$ ,  $|f| \leq |g|$  ou  $f = \underset{+\infty}{\circ}(g)$  ou  $f = \underset{+\infty}{\circ_0}(g)$ ,

alors

**C1**  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$ .

■ Si  $f \underset{+\infty}{\sim} g$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a, +\infty[$  si et seulement si  $g$  l'est.



## INTÉGRALE GÉNÉRALISÉE SUR UN INTERVALLE QUELCONQUE

### 1 Cas d'un intervalle semi-ouvert

On généralise les résultats précédents aux intervalles de la forme  $[a, b[$  ou  $]a, b]$  avec  $a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  tels que  $a < b$ .

#### Définition 4 : Intégrale convergente

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $[a, b[$  (respectivement  $]a, b]$ ) à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On dit que  $\int_a^b f$  est **convergente** lorsque  $x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  a une limite finie en  $b$  (respectivement  $x \mapsto \int_x^b f(t) dt$  a une limite finie en  $a$ ).

Dans ce cas, on note  $\int_a^b f(t) dt$  ou  $\int_a^b f$  cette limite.

Lorsque  $f$  est à valeur réelles positives et que  $\int_a^b f(t) dt$  diverge, on note  $\int_a^b f(t) dt = +\infty$ .

On dit que  $f$  est **intégrable** sur  $[a, b[$  (respectivement  $]a, b]$ ) lorsque  $\int_a^b |f|$  converge, et on note  $f \in L^1([a, b[, \mathbb{K})$  (respectivement  $f \in L^1(]a, b], \mathbb{K})$ .)

#### Propriété 7 : Intégrales de Riemann

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

■  $x \mapsto \frac{1}{|x|^\alpha}$  est intégrable sur  $[1, +\infty[$  (respectivement  $]-\infty, -1]$ ) si et seulement si  $\alpha > 1$ .

■  $x \mapsto \frac{1}{|x|^\alpha}$  est intégrable sur  $]0, 1]$  (respectivement  $[-1, 0[$ ) si et seulement si  $\alpha < 1$ .

■ Pour  $\alpha = 1$ ,  $x \mapsto \frac{1}{x}$  n'est intégrable ni en 0, ni en  $\pm\infty$ .

#### Théorème 6 : Intégrabilité par comparaison

Soient  $f, g \in \mathcal{C}_m([a, b[, \mathbb{K})$ .

■ Si  $g$  est intégrable sur  $[a, b[$  et que l'une des deux hypothèses suivantes est vérifiée :

Au v. de  $b$ ,  $|f| \leq |g|$  ou  $f = \underset{b}{\circ}(g)$  ou  $f = \underset{b}{\circ_0}(g)$ ,

alors  $f$  est intégrable sur  $[a, b[$ .

■ Si  $f \underset{b}{\sim} g$ , alors  $f$  est intégrable sur  $[a, b[$  si et seulement si  $g$  l'est.

On a un énoncé analogue sur  $]a, b]$  en comparant au voisinage de  $a$ .

### Propriété 8 : Indépendance du choix de l'autre borne

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $[a, b]$ ,  $c \in [a, b]$ .

Alors  $\int_a^b f$  converge si et seulement si  $\int_c^b f$  converge.

On a un résultat analogue pour une fonction continue par morceaux sur  $]a, b]$ .

### Propriété 9 : Cas d'une fonction prolongeable par continuité

Soit  $-\infty < a < b < +\infty$  et  $f$  continue par morceaux sur  $[a, b]$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On suppose que  $f$  a une limite finie en  $b$ , c'est-à-dire qu'elle est prolongeable par continuité en une fonction  $\tilde{f}$  continue par morceaux sur  $[a, b]$ .

Alors  $f$  est intégrable sur  $[a, b]$ .

On a un énoncé analogue sur  $]a, b]$ .

■ L'application  $f \mapsto \int_I f$  est une forme linéaire de cet espace.

## 2 Cas d'un intervalle ouvert

### Définition 5 : Convergence d'intégrale et intégrabilité sur un intervalle ouvert

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $]a, b]$  à valeurs dans  $\mathbb{K}$ .

On dit que  $\int_a^b f$  est **convergente** lorsqu'il existe  $c \in ]a, b[$  (qui est en fait quelconque d'après la propriété précédente) tel que  $\int_a^c f$  et  $\int_c^b f$  sont convergentes.

Dans ce cas, on note

$$\int_a^b f = \int_a^b f(t) dt = \int_a^c f(t) dt + \int_c^b f(t) dt.$$

On dit que  $f$  est **intégrable** sur  $]a, b[$  lorsque  $\int_a^b |f|$  converge et on note  $f \in L^1(]a, b[, \mathbb{K})$ .

## 3 Intégrabilité sur un intervalle quelconque

$I$  est un intervalle de  $\mathbb{R}$  d'intérieur non vide.

### Théorème 7 : L'intégrabilité implique la convergence de l'intégrale

Soit  $f$  continue par morceaux sur  $I$ . Si  $f$  est intégrable sur  $I$ , alors  $\int_I f$  converge.

### Propriété 10 : Espace vectoriel $L^1(I, \mathbb{K})$

■ L'ensemble des fonctions continues par morceaux intégrables sur  $I$  a une structure de  $\mathbb{K}$ -espace vectoriel. Cet espace vectoriel est noté  $L^1(I, \mathbb{K})$ .

### Propriété 11 : Inégalité triangulaire

Si  $f$  est intégrable sur  $I$ ,

$$\left| \int_I f \right| \leq \int_I |f|.$$

### Propriété 12 : Cas des fonctions à valeurs complexes

Si  $f$  est à valeurs complexes,  $\int_I f$  converge si et seulement si  $\int_I \Re(f)$  et  $\int_I \Im(f)$  convergent.

$$\text{Dans ce cas, } \int_I f = \int_I \Re(f) + i \int_I \Im(f).$$

## 4 Étude et rédaction de l'existence d'une intégrale



**Méthode 1 : Étudier l'intégrabilité de  $f$  sur un intervalle  $I$  ou étudier la convergence de  $\int_a^b f$**

(ce n'est pas la même chose !)

#### Position du problème

■ Si  $I$  est un segment, il n'y a pas de problème.

■ Si  $I$  est un intervalle bornée sur lequel  $f$  est bornée, alors  $f$  est intégrable par comparaison à une fonction constante qui est intégrable. C'est le cas par exemple si la fonction est continue et prolongeable par continuité en une borne ouverte (et c'est alors encore plus simple à justifier : il suffit de considérer l'intégrale sur un segment du prolongement, qui ne présente pas de problème).

■ Si  $I$  est un intervalle ouvert  $]a, b[$ , on étudie séparément l'existence de  $\int_a^c f$  et  $\int_c^b f$ . Le réel  $c$  est choisi quelconque dans  $]a, b[$  et on est ramené à une étude sur  $]a, c[$  et  $[c, b[$  (semi-ouverts).

#### Cas des fonctions positives

Dans ce cas, la convergence de l'intégrale est équivalente à l'intégrabilité. Bien insister dans la rédaction :

« La fonction  $f : x \mapsto \dots$  est continue (par morceaux), **positive** sur l'intervalle ... »

en précisant bien l'intervalle.

S'il est ouvert, on coupe en deux et on étudie **séparément** les deux intégrabilités.

#### Cas des fonctions non positives

... ni négatives.

Dans ce cas, on s'intéresse soit à l'intégrabilité (absolue convergence), soit à la (semi)-convergence de l'intégrale (mais cette dernière n'est pas un objectif du programme).



### PROPRIÉTÉS DES INTÉGRALES GÉNÉRALISÉES

#### 1

#### Relation de Chasles

La notion d'intégrale généralisée se... généralise au cas où les bornes ne sont pas dans le bon sens.

#### Propriété 13 : Relation de Chasles

Soit  $f \in \mathcal{C}_m(I, \mathbb{K})$  telle que  $\int_I f$  converge.

(i) Si  $J$  sous-intervalle de  $I$ , alors  $\int_J f$  converge.

(ii) Si  $a, b, c \in \bar{I}$  éventuellement infinis,

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f,$$

toutes ces intégrales étant bien convergentes.



### CHANGEMENTS DE VARIABLE, INTÉGRATIONS PAR PARTIES

#### 1

#### Changement de variable

#### Théorème 8 : Changement de variable

Soit  $\alpha, \beta, a, b \in \mathbb{R} \cup \{\pm\infty\}$  et  $\varphi : ]\alpha, \beta[ \rightarrow ]a, b[$  une bijection de classe  $\mathcal{C}^1$ . Alors  $\varphi$  est strictement monotone.

On suppose que  $\varphi(u) \xrightarrow[u \rightarrow a]{} a$  et  $\varphi(u) \xrightarrow[u \rightarrow \beta]{} b$  (quitte à échanger les bornes des intervalles).

Alors  $\int_a^b f(t) dt$  et  $\int_\alpha^\beta f(\varphi(u))\varphi'(u) du$  sont de même nature. En cas de convergence, elles sont égales.

#### Propriété 16 : Intégrales de Riemann

Soit  $\alpha \in \mathbb{R}$  et  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $x \mapsto \frac{1}{|x - a|^\alpha}$  est intégrable sur  $[b, a[$  (respectivement  $]a, b]$ ) si et seulement si  $\alpha < 1$ .

#### 2

#### Intégration par parties

On ne fait pas d'intégration par partie sur des intégrales généralisées : on pourrait faire apparaître des termes qui n'existent pas.

Donc on repasse à une intégrale sur un segment, on intègre par parties puis on passe à la limite.



### INTÉGRATION DES RELATIONS DE COMPARAISON

#### Théorème 9 : Intégration des relations de comparaison

Soit  $f \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{K})$  et  $g \in \mathcal{C}_m([a, b], \mathbb{R}^+)$  une fonction à valeurs réelles positives.

**Cas de divergence** Si  $\int_a^b g$  diverge et

(i) si  $f = \underline{o}_b(g)$ , alors  $\int_a^x f = \underset{x \rightarrow b}{o}_b \left( \int_a^x g \right)$

(ii) si  $f = \overset{o}{b}(g)$ , alors  $\int_a^x f = \underset{x \rightarrow b}{o}_b \left( \int_a^x g \right)$

(iii) Si  $f \sim_b g$ , alors  $\int_a^x f \underset{x \rightarrow b}{\sim} \int_a^x g$

**Cas de convergence** Si  $\int_a^b g$  converge et

(i) si  $f = \underline{o}_b(g)$ , alors  $f$  intégrable et  $\int_x^b f = \underline{o}_b \left( \int_x^b g \right)$

(ii) si  $f = \overset{o}{b}(g)$ , alors  $f$  intégrable et  $\int_x^b f = \overset{o}{b} \left( \int_x^b g \right)$

(iii) Si  $f \sim_b g$ , alors  $f$  intégrable et  $\int_x^b f \underset{x \rightarrow b}{\sim} \int_x^b g$

On a un énoncé analogue sur  $]a, b[$ .

#### 3

#### Intégrale généralisée dépendant d'une borne

#### Propriété 15 : Déivation

Les bornes ouvertes peuvent être éventuellement infinies.

Si  $f$  est continue sur  $[a, b[$  et si  $\int_a^b f$  converge, alors  $g : x \mapsto \int_x^b f(t) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $[a, b[$  et  $g' = -f$ .

Si  $f$  est continue sur  $]a, b]$  et si  $\int_a^b f$  converge, alors  $h : x \mapsto \int_a^x f(t) dt$  est de classe  $\mathcal{C}^1$  sur  $]a, b]$  et  $h' = f$ .